

AĞRI DAĞI'NIN FLORASI



T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI



İĞDİR ÜNİVERSİTESİ

Ankara - 2016

AĞRI DAĞI'NIN FLORASI

Yusif ZEYNALOV

Mete TÜRKOĞLU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, 2015-03-27

ISBN : 978-605-4610-89-1

İletişim :

zeynalovyusuf@hotmail.com

mturkoglu@ormansu.gov.tr

Grafik Tasarım :

Yusuf MEŞE (Ajanstürk)

Baskı-Cilt :

AJANS-TÜRK GAZETECİLİK MATBAACILIK İNŞ. SAN. A.Ş.

İstanbul yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Caddesi. No: 24 Batıkent-Ankara

Tel: 0312 278 08 24 - Faks: 0312 278 18 95

www.ajansturk.com.tr - info@ajansturk.com.tr

Bu kitabın bütün hakları T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına aittir.

Kaynak ve yazar ismi kullanılarak alıntı yapılabilir.

AĞRI DAĞI'NIN FLORASI

Yusif ZEYNALOV

•

Mete TÜRKOĞLU

İÇİNDEKİLER

Familiya	Sayfa
Genel Müdür /Önsözü	VII
Yusif ZEYNALOV/ Önsöz	IX
Yusif ZEYNALOV/ Teşekkür yazısı.....	X
Yusif ZEYNALOV/ Özgeçmiş	XI
Mete TÜRKOĞLU/ Özgeçmiş	XII
Ağrı Dağı Florası Kitabının tanıtım yazısı	XII
Giriş	XIV
Kitabın kullanım klavuzu.....	XIX

Familiya Bilgileri (Latince)	Sayfa
Grimmiaceae	1
Amaranthaceae	2
Apiaceae.....	3-15
Asteraceae	16-67
Betulaceae.....	68
Berberidaceae	69
Boraginaceae.....	70-84
Brassicaceae	85-101
Campanulaceae	102-104
Caprifoliaceae.....	105-107
Caryophyllaceae	108-127
Chenopodiaceae.....	128-131
Convolvulaceae	132-133
Crassulaceae	134-137
Cucurbitaceae	138-139
Cyperaceae.....	140
Cupressaceae.....	141-143
Cuscutaceae	144-145
Dipsacaceae	146-148
Euphorbiaceae	149-152
Ephedraceae.....	153-154
Fabaceae	155-192
Gentianaceae.....	193
Geraniaceae	194-198
Globulariaceae.....	199
Hypericaceae.....	200-201
Iridaceae	202-206

Illecebraceae	207
Lamiaceae	208-233
Liliaceae	234-244
Linaceae	245-256
Malvaceae	257-261
Orchidaceae	262-264
Orobanchaceae	265-269
Papaveraceae	270-278
Primulaceae	279-282
Plantaginaceae	283-285
Plumbaginaceae	286-287
Poaceae	288-304
Polygonaceae	305-309
Ranunculaceae	310-319
Resedaceae	320
Rhamnaceae	321
Rosaceae	322-345
Rubiaceae	346-351
Salicaceae	252
Saxifragaceae	253
Scrophulariaceae	354-372
Solanaceae	373-374
Tamaricaceae	375
Thymelaceae	376
Urticaceae	377
Ulmaceae	378-379
Valerianaceae	380-381
Violaceae	382-383
Zygophyllaceae	384-386

Önsöz



Türkiye'nin ve Avrupa Kıtası'nın en yüksek, dünyanın ikinci en büyük volkanik dağı olan Ağrı Dağı, Türkiye'nin doğu ucunda, Ağrı ve Iğdır illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Zirvesinde Türkiye'nin en büyük buzulu bulunan Ağrı Dağı, başta dağcılık olmak üzere doğa yürüyüşleri ve

yamaç paraşütü gibi çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerin önemli bir merkezi konumundadır.

Ağrı Dağı, tarihi, kültürel ve jeolojik öneminin yanı sıra coğrafi konumu nedeniyle biyolojik çeşitlilik açısından da önemli bir merkezdir. Üç ülkeye sınır olmasından dolayı Doğu Anadolu bölgesinin stratejik bir bölgesinde bulunan Ağrı Dağı, bitki çeşitliliği bakımından önemli bir alan niteliği taşımaktadır. Taşıdığı önem nedeniyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen milli park çalışmaları kapsamında Ağrı Dağı ile yakın çevresini kaplayan 88.104 hektarlık alan, 2004 yılında "Ağrı Dağı Milli Parkı" olarak ilan edilmiştir.

Doğa koruma ve korunan alan çalışmaları kapsamında bir alanın biyolojik çeşitliliğinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde, Genel Müdürlüğümüz ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin tespitine yönelik olan çalışmalarını attırma gayreti içerisinde. Bu kapsamda şimdiye kadar Ağrı Dağı ve yakın çevresinin florasını tespit etmeye yönelik olarak kapsamlı bir çalışmanın bulunmaması dolayısıyla, Iğdır Üniversitesi ve Genel Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde Ağrı Dağı'nın florasını detaylı bir şekilde ortaya koyan bir çalışma hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Ağrı Dağı'nın Florası" isimli bu yayın, Ağrı Dağı ve çevresinin floristik zenginliğinin ortaya konulması ve bu zenginliği koruma konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi maksadıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmanın bilim insanlarına, öğrencilere ve koruma konusunda çalışanlara ve tüm kamuoyuna katkı sağlamasını temenni ederim.

Nurettin TAŞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü

Yusif ZEYNALOV / Önsöz

İğdır İli sınırları içinde (%70) bulunan Ağrı Dağı konum itibarı ile ülkemizin önemli büyük dağlarından biridir. Bu özelliğinden dolayı her zaman göz önünde olan ilin bir diğer dikkat çeken tarafı ise zengin floristik yapısıdır. Bitki çeşitliliğinin zengin olması coğrafik olarak 3 ülkeye sınır olmasından dolayı Doğu Anadolu bölgesinin en önemli stratejik bir noktasıdır. Bu zenginliğin ortaya konulması yönünden şimdiye kadar İğdır ili ve Ağrı Dağı'nı hedef alan bir çalışma yapılmamıştır.

Bu çalışmadan önce İğdır ilinde 50 familya, 167 cins ve 300 taksonun varlığı bilinmekteydi. Bu çalışma sırasında 500 adet taksonun tespiti yapılmıştır ve İğdır ili için yeni olanlar yayına hazır hale getirildikten sonra yayınlanacaktır. Tespiti yapılan taksonlardan 52 adeti endemik taksondur.

Çalışmamızın bir kısmını içeren bu kitapta 55 familya, 204 cins ve 386 taksona yer verilmiştir. Bu kitapta yer alan taksonlardan % 40'ı C10 İğdır ili için ilk defa bu çalışmada tespit edilmiş bitkilerdir. Ayrıca 52 endemik takson yer almaktadır ve bunlardan da 20 tanesi İğdır İli için Endemiktir.

Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler Ağrı Dağı florasının zenginliğini ortaya koyma çabalarımızı destekler yönde olmuştur. Böyle bir zenginliğin kamuoyu tarafından fark edilmesi ve gerekli bilincin sağlanması, farkındalığın oluşması amacı ile bu kitap basıma hazırlanmıştır.

Bu adımdan bugünlere gelene kadar yoğun bir çalışma yürütülmüş ve "AĞRI DAĞI'NIN FLORASI" adlı kitabımız sizlerin beğenisine sunulmuştur.

Bu kitap bilim adamları, lisans ve lisansüstü öğrenciler, Doğa Turizmi kısaca toplumun her kesimine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle Üniversitelerin Biyoloji Bölümleri, Ziraat Fakültesi ve orta öğretim öğrencilerimize faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Umarız herkese fayda sağlayacaktır.

Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV

TEŞEKKÜR

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın **Prof. Dr. Veysel EROĞLU**'na, Yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın **Nurettin TAŞ**'a, XIII. Bölge Müdürümüz Sayın **Ahmet AKKIPRIK**'e, Rektörümüz Sayın **Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz** ve kitabın yayınlanmasını özellikle isteyen Aralık ilçesi eski Kaymakamı **Mehmet Fatih ÇİÇEK**'e ,

Her zaman espirili ve pozitif yaklaşımları ile katkı sağlayan Fotoğrafçımız **İsmail ŞAHİNBAŞ**'a,

İğdırın Eski Valisi **Amir ÇİÇEK** ve yeni **Valimiz Davut HANER**'e,

Eski Dekanımız **Prof. Dr. Hüseyin Zengin**'e,

Ziraat Fakültesi Dekanı **Prof. Dr. Emin ERDEM**'e,

İğdır Üniversitesi Öğretim elemanlarından **Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM**, Yrd. Doç. Dr. **Peiman MOLAEI**, Yrd. Doç. Dr. **Hakkı AKDENİZ**, Yrd.Doç. Dr. **Ahmet Metin KUMLAY**, Yrd. Doç. Dr. **Uğur ŞİMŞEK**, Doç. Dr. **Ecevit EYDURAN**, Yrd. Doç. Dr. **Celalettin GÖZÜAÇIK**"a,

Asitanlarımızdan **Ahmet KOÇ**, **Badel UYSAL** ve **Mustafa AKBABA**,ya,

Master öğrencilerimizden **İbrahim ARAS**'a,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğü İğdır İl Şube Müdürlüğü personellerine, Eğitim tanıtım Şube Müdürü **Bülent BOZ**'a Çalışmalarımızı her yönüyle destekleyen Ziraat Mühendisi **Mehmet Nuri TURAN**'a,

Her zaman desteğini gördüğüm eşim **Mihriban**, çocuklarım **Elşen**, **Elçin**, **Elnur**, **Rasim**, gelinlerim **Xeyale**, **Gülüş**, **Jale** ve torunlarım **Yusif ELŞENOĞLU**, **Ayxan**, **Uğura** ve **Nezrine**'e,

Kitaba emek veren ve burada ismi geçmeyen herkese

Sonsuz teşekkürler...

Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV



Yusif ZEYNALOV

Evli ve 4 çocuk babası olan Doç. Dr. Yusuf ZEYNALOV, 29 Nisan 1949'da Azerbaycan'ın Gedebeý ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise öğrenimini 1966 yılında tamamladı. Aynı yıl Azerbaycan Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesini kazandı. Bu fakülteden 1971 yılında mezun oldu, aynı yıl Leningrad Pawlow Tıp Akademisinde Yüksek Lisansını tamamladı. 1974 yılına kadar Azerbaycan'ın Sabirabad ilçesinin Halfeli köyünde Biyoloji-Kimya öğretmeniği yaptı. 1974–1976 yılları arasında Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığında Botanik Şubesi Müdürlüğü görevinde bulundu. 1976–1996 yılları arasında Azerbaycan bilimler akademisinde çeşitli görevlerde bulundu. 1984 yılında doktorasını Orta Asya Yemişen (*Crataegus* L) Türlerinin Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi üzerine tamamladı. 1986 yılında Doçentlik unvanını aldı. Doktora çalışmalarının yanında Kafkasya ve Orta Asya'nın odunsu ve ilaç bitkileri üzerine çeşitli çalışmalarda bulundu. 1996–1999 yıllarında Kars Kafkas Üniversitesinin Biyoloji Bölümünde görev aldı. 1999–2007 yılların'da Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde çalışmıştı, Bu zaman zarfında, Gaziantep İlinin Florasının Belirlenmesi, Gaziantep Üniversitesi Botanik Bahçesinin Kurulması ve İlaç Bitkileri üzerine çalışmalar sürdürdü. Bilimsel çalışmalarının sonuçlarını günümüze kadar 220'e yakın yayın yaparak bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. 2008 yılında "İlaç bitkileri ve onlarla tedavi" kitabı yayınlandı.Yine 2008-2011 yıllarında Gaziantep çiçekleri I. II. Cilt kitapları,2012 yılında Ağrı Dağı ile bağlı "Nuhun çiçekleri" kitabı yayınlanmıştır.

Gaziantep Üniversitesinde çalıştığı zaman zarfında 6 yüksek lisans 2 doktora öğrencisi yetiştirdi. 1 DPT 4 araştırma enstitüsü projesinde yürütücü (hepsi tamamlanmış), 1 DPT, 6 Araştırma projesinde yardımcı olarak görev yaptı. Ağrı Dağı ile bağlı 1 proje TUBİTAK'a sunmuştur (yürütücüsü olarak)

2007-2010 yıllarından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Başkan danışmanı olarak görev yapmıştır.2010 yılından itibaren Iğdır Üniversitesinde çalışmaktadır. Ağrı Dağı ile bağlı bir proje yürütmektedir.



Mete TÜRKOĞLU

1967 yılında Iğdır'da doğdu. İlk orta ve liseyi Iğdır'da bitirdi. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmen olarak atandı.

1997-1999 yılları arasında Iğdır'da Öğretmen, okul Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Edirne Bölge Müdürlüğünde Mühendis ve İdari Mali İşler Şube Müdür V, 2001-2005 tarihleri arasında Iğdır Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünde Arazi İşleri Şube Müdür V, 2005 yılında Iğdır İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde AGM-DKMP-ORKÖY Şube Müdür V. 2006 yılında Kafkas Üniversitesi ve Kuzey Doğa Derneği ile Aras Kuş Halkalama ve izleme çalışmalarında,

2008 yılında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Iğdır İl Temsilciliği tarafından, Iğdır İline yönelik Doğal Hayatın korunması, çevre bilincinin gelişmesi, ağaç ve doğa sevgisinin kazandırılması çalışmaları, okullarda eğitim çalışmaları, orman alanlarında Ağaçlandırma sahalarında Damlama Sulama projelerine Hazırlık Çalışmaları yapması, Sulak Alanların ve Doğal yaşamın geliştirme çalışmaları ile Ülkemizde ender bulunan Su Samuru, Coypu (Su Maymunu) ile ilgili Kırıkkale Üniversitesi ile birlikte yürütüp çeşitli bilimsel dergilerde yazı ve fotoğraflarının yayımlanması, İlimizde Bilir kişi Eğitimine katkıda bulunması, hazırlayıcı eğitim vermesi ve Iğdır'ı tanıtımı açısından yaptığı çalışmalar nedeniyle Yılın Başarılı Mühendisi Hizmet ve Teşvik Ödülüne layık görüldü.

2012 yılında Iğdır Eko Turizm Doğa Master Planını hazırladı, SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) ile Iğdır Turizm Keşif Reberi ve Yürüyüş Rotaları adlı tanıtım kitapçığını yayınladı. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademisyenleri ile birlikte "Ağrı Dağı Flora ve Mera durumlarının izlenmesi, Envanteri" TÜBİTAK Projesi çalışmasında,

2013 Yılında Küçük Akbabaların Göç Yollarının izlenmesi ve yaşam alanları Projesinde yer aldı. Yaban hayatının Foto Kapanla izlenmesi ve fotoğraflandırılması çalışmaları ve İran, Suriye gibi Rüzgar erozyonuna maruz ülkelerde üretimine önem verilen Erozyonu önlemede büyük katkı sağlayan ve Türkiyede Konya Karapınardan sonar ikinci Erozyon Rüzgar Bölgesi olan Aralık İlçesinde Ebu cehil Çalısı üretimi, bölge ekonomisine kazandırılması noktasında önemli Çalışmalarda bulundu. Halen Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Iğdır İl Şube Müdürü olarak görev yapmakta, Evli ve orta derecede ingilizce bilmektedir.

AĞRI DAĞI'NIN FLORASI KİTABININ TANITIM YAZISI

İğdır ilindeki Ağrı Dağı floristik çalışmaları 2011 yılından itibaren Proje kapsamında başlatılmış ve bugüne kadar aralıksız olarak sürdürülmüştür. Bu çalışmaların meyvesi olan bilimsel makaleler yazılmış dergi, kongre ve sempozyumlarda yayınlanmış ve sunulmuştur.

Çalışmalar sonucunda elde edilen floristik verilerin halka ulaştırılmasında elimizdeki envanterin kitaba dönüştürülmesi fikri ortaya çıkmış ve çalışmalarımız bu yönde şekillenmiştir. Bu yönelmenin ardından bu kitabın öncüsü olan Gaziantep Çiçekleri I. ve II. adlı kitabımız 2008-2011 yılında basılmıştır. İlk kitapta 79 familyaya ait 59'u endemik olan 544 takson yer almıştır.

Birinci kitabı basımından sonra çalışmalara ara verilmeden devam edilmiş eldeki bilgiler değerlendirilerek toparlanmıştır. Bunun sonucu olarak Gaziantep çiçekleri II adlı kitabın baskısı için gerekli birikim sağlanmıştır.

Gaziantep çiçekleri II adlı kitapta 87 familyaya ait 502 takson yer almaktadır. Bunlardan 249 tanesi C6 karesine, 427 tanesi ise Gaziantep için ilk defa bizim tarafımızdan kayıt altına alınmıştır. Ayrıca bu bitkilerden 54 tanesi Endemik bitkidir.

Ağrı dağı'nın florası kitabımızda ise 55 familyaya ait 204 çins ve 386 tür yer almaktadır. Bu taksonlardan 52 tanesi endemik 4 tanesi ise ilk defadır ki bizim tarafınızdan yeni tür olarak kayıta geçirilmiştir.

Bu kitabın bu seviyeye gelmesinde Eski Aralık Kaymakamı Mehmet Fatih ÇİÇEK'in büyük katkıları olmuştur. Fotoğrafların bir kısmını fotoğrafçı İsmail ŞAHİNBAŞ tarafından çekilmiştir. Fotoğraflar Ağrı Dağının doğasından çekilmiş Bilimsel teşhisler ve kitabın düzenlenmesi benim tatafımdan yapılmıştır.

Kitapta gösterilen yükseklikler ve bitkilerin çiçek açma zamanı Ağrı Dağında kendi tespitlerimize göre verilmiştir.

Doç. Dr. Yusuf ZEYNALOV

GİRİŞ

İğdır İli, Doğu Anadolu bölgesinde Sürmeli Çukuru adı verilen Ağrı Dağı eteklerinde yer almaktadır. Göçmen kuşlar için bir geçiş güzergâhı olan Aras Havzası ilin sınırları içerisinde. Kafkaslardan Anadolu'ya geçiş bölgesinde yer alması, mikroklima alanlarına sahip olması, dar bir alan içerisinde 600-5000 m rakımın bulunması, göçmen kuşların göç yollarından birinin İğdır'dan geçmesi ve İran-Turan bitki kuşağının Avrupa-Sibirya kuşağına yaklaştığı bir noktada bulunması, ili biyolojik yönden zengin kılmaktadır.

İğdır'ın Konumu

İğdır (3.588 km²), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Bölümü'nde yer almaktadır. (Türkoğlu ve Duran 2006). Önemli bir kültür ve yol kavşağında bulunan İl, Ermenistan, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ve İran ile sınır komşusu olup Türkiye'nin üç ülkeyle sınırı olan tek ilidir. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüz ölçümünün üçte ikisi, İl sınırları içindedir. Türkiye'nin doğusunda Ermenistan ile sınırı belirleyen Aras Nehri, Arpaçay ile birleştikten sonra İğdır sınırları boyunca akar.

İğdır'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi

Türkiye'nin doğu sınırında yer alan İğdır Aras Nehri boyunca yer alan tektonik bir çöküntü ovasıdır. Çevresine göre daha düşük olan yıllık yağış miktarı, kurak yaz ve ılıman kış şartları nedeniyle "mikroklima" özelliği gösterir. Büyük ve Küçük Ağrı, Zor, Durak ve Pamuk Dağları önemli yükseltileri, Aras ve Karasu nehirleri önemli akarsuları oluşturur. Aras nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan İğdır Ovası, Batı İğdır, Doğu İğdır ve Dil Ovası'ndan oluşmaktadır.

İğdır'ın iklimi Doğu Anadolu tipi karasal iklimdir. Şehrin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden dağlar tarafından çevrelenmiş bir çanak şeklinde olduğundan fazlaca etkilenmez. Kuytu konumuyla mikroklima oluşturan İğdır Ovası'nda yer alan İğdır yerleşim alanında yıllık ortalama sıcaklık 11,6 °C'dir. Kışlar yumuşak, yazlar ise daha uzun ve sıcak geçer. En yüksek sıcaklık değerlerine Ağustos 41,8 °C, en düşük sıcaklık değerlerine de Aralık ayında -30,3 °C rastlanmaktadır. Yıllık yağış toplamı 257,6 mm. civarındadır, yağışsız sıcak hava dalgaları mutlak yaz kuraklığına neden olmaktadır (IMM 2006)

İğdır'ın Arazi Dağılımı

İğdır ili arazilerinin büyük bir kısmı çayır-mera arazisi olarak değerlendirilmektedir (% 41). Tarım alanları % 33, kullanılmayan alanlar % 26'lık bir paya sahiptir. Ormanlar ise % 1'den daha az bir alanı kaplamaktadır. (İTİM 2002).

Ormanlar

Yarı kurak iklim Doğu Anadolu'nun tipik bitkisel örtüsü olan bozkırın İğdır'da geniş alanlar kaplamasına sebep olmuştur. Orman açısından ülkenin en fakir bölgelerinden biridir. Bu yüzden ovada genellikle tuzcul bitkiler görülür (Türkoğlu ve Duran 2006). Ardıç, gürgen, huş, titrek kavak, meşe ve söğüt orman alanlarındaki belli başlı ağaç türlerini oluşturmaktadır (Türkoğlu ve Duran 2006).

Sulak Alanlar:

Sulak alanlar biyolojik çeşitlilik ve ekosistem dengesi açısından tabiatın önemli unsurlarındandır. Hâlen il sınırları içerisinde tescil edilmiş ve Koruma altında olmayan sulak alanlar mevcuttur. Bunlar Aras ve Karasu Taşkınları Sulak Alanı, Bulakbaşı Sulak alanı, Çıyıklı Sulak alanı ve Süreyya Çeşmesi sulak alanlarıdır.

Aras ve Karasu Taşkınları Sulak Alanı

Aras Nehri boyunca yer alan tektonik kökenli bir çöküntü ovasıdır. Kuzeyden güneye Tuzluca İlçesi bozkırlarından başlayıp Aras Nehri taşkınlarını kapsayacak şekilde batıya (Aralık İlçesine doğru) ilerleyerek İğdır Ovası'nın bir kısmını ve Dil Ovası'nı içine almaktadır. 9089 hektar dır. Oluşturduğu doğal görünüm ve güzellik açısından ayrı yaşam alanı sunmakta ve göç eden kuşların uğrak yeri olma özelliği göstermektedir.

Bulakbaşı köyündeki sulak alan, Çevresi bol sazlık ve kamışlıktır. Gölde birçok su kuşu yuvalanmakta ve üremektedir.

Çıyıklı Köyü civarındaki sulak alan Aras nehri güzergâhı üzerindedir. Göçmen kuşların önemli uğrak yerlerindendir.

Aras nehri ve karasudan beslenen Süreyya Çeşmesi Sulak Alanı da sazlık ağırlıklı bir alandır. Çok sayıda kuş barındırmakla beraber bu kuşların tanımlanması konusunda her hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Alanın İran-Türkiye sınırında olması ve sınır ötesine uzanması önemini artırmaktadır.

Flora ve Endemik Bitkiler:


Zengin bitki örtüsüne sahip olan Iğdır'da yaklaşık 1000-1100 tür bitki bulunduğunu tahmin edilmektedir. Şimdiye kadar tesbit edilen 500 bitki türü içerisinde yaklaşık 52 üzerinde Endemik bitki tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin tamamı ile ilgili çalışma Ağrı Dağı'nda yapılmıştır. Endemik bitkilerin olduğu zengin bir yerdir Büyük ve Küçük Ağrı bilim dünyasına yeni tanıtılan 4 bitki türü tespit edilmiştir. Bunlar *Jurinella moschus* (Habl.) ssp *pinnatisecta* (Boiss.) Danina & Davis var.*agridagensis* Y.Z. - Ağrı'dağı Kazan Kulpu, *Astragalus vesicaris* L. subsp.*agridagensis* Y.Z.- Ağrı Dağı Geveni, *Linaria genistifolia* L. subsp. *agridagensis* Y.Z. - Ağrı Dağı Katırtırnağımsı Nevruz Otu. (Y. ZEYNALOV).

Fauna ve Endemik Hayvanlar:

Iğdır il sınırları içerisinde rastlanan fauna örneklerini ise Bozkır Şahini, Arı Şahini, Kınalı keklik, çil keklik, Puhu Kuşu, baykuş, yaban Domuzu, Kaya Kartalı, tilki, kurt, Atmaca, macar ördeği, sakarmek, kara bataklık, bahri ördeği, tepeli toygır, tavşan, vaşak, Ayı, akbaba, Delice ve Küçük Kerkenez olarak sıralayabiliriz. Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Kuzey doğa derneği tarafından yürütülen halkalama çalışmaları neticesinde, 227 tür kuş gözlenmiş olup 185 türden yaklaşık 70.000 kuş halkalanmış ve kayıt altına alınmıştır.(Kuzeydoğa).

Iğdır ve Aras Vadisi kuşların göç yolu üzerinde bulunmakta Kuşlar Rusya, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Finlandiya, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Belarus gibi ülkelerden, gruplar halinde yavrularıyla birlikte bu vadiye konaklamakta, buradan Afrika'ya gitmektedir. Kafkas Çıvgını, Yeşil Arı Kuşu ve Saz Horozu Türkiye'de ender görülen türlerden olup; Doğu Anadolu Bölgesinde de sadece Iğdır'da bulunmaktadır. Türkiye'de sadece Kızılırmak Deltası, Göksu deltası ve Çukurova'da üreyen *Porphyrio porphyrio* (Saz Horozu) Iğdır Tuzluca Yukarı Çıyrıklı Köyünün birinci göl mevkiinde ürettiği tespit edilmiş ve Türkiye'de dördüncü üreme bölgesi olduğu ortaya çıkarılmıştır (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 2006).

Ayrıca iki büyük memeli türü de Bulakbaşı köyü sulak alanındaki gölde yaşamaktadır. Karnivorlardan nesli tehlike altında olan Su samuru (*Lutra lutra*) ve rodentlerden Su maymunu (*Myocastor coypus*). Türkiye'nin en batısı olan Trakya bölgesinde daha önce tespit edilmiş olan su maymunu ikinci olarak Türkiye'nin en doğusu olan Iğdır ilimiz Karasu bölgesinde olduğu görülmüştür (Türkoğlu vd 2008).



KİTABIN KULLANIM KILAVUZU

Bitkinin Latince
Familiyası

Bitkinin Türkçe
Familiyası

Bitkinin
Latince Adı

Bitkinin
Türkçe Adı

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea cheiranthifolia
Willd. var *purpurascens* (DC.)
Waagenitz M.Bieb.

Türkçe:
Acımık Morumsu
peygamber çiçeği



Ağrı Dağı: ☐ B10: ☐ Yaşı: Çok yıllık Hayat Formu: Otsu Yükseklik: 1600-2000 Çiçekleme Ayları: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fitocoğrafik Bölge: Öksin elementi Endemizm: E E

Yeni
bulunan ☒
Önceden
bilinen ☐

Floristik kare
Yeni
bulunan ☒
Önceden
bilinen ☐

Kaç yıllık
olduğu

Hayat formu
nasıl olduğu

Hangi
yüksekliklerde
yetiştği

Hangi aylarda
çiçek açtığı

Bağı
bulunduğu biti
bölgesinin adı

Endemik olup
olmadığı

Family (Latince):
Grimmiaceae

Familya (Türkçe):
Karayosunları

Bitkinin Adı:
Grimmia orbicularis
Bruch ex Wilson

Türkçe:
Karayosunu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
-

Yükseklik:
2000-2800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibiriya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Amaranthaceae

Familya (Türkçe):
Tilkikuyruğugiller

Bitkinin Adı:
Amaranthus retroflexus L.

Türkçe:
Kırmızı köklü
horoz ibiği



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
otsu

Yükseklik:
700-1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydonozgiller

Bitkinin Adı:
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Türkçe:
Gımıgımı, gımı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
otsu

Yükseklik:
800-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydanozgiller

Bitkinin Adı:
Anthriscus nemorosa(Bieb.)
Spengel

Türkçe:
Gımgıgımı, gımı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1900

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydanozgiller

Bitkinin Adı:
Carum carvil L.

Türkçe:
Kır kimyonu,
Tarak otu



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ çok yıllık

Hayat Formu:
otsu

Yükseklik:
1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydanozgiller

Bitkinin Adı:
Conium maculatum L.

Türkçe:
Baldıran



Ağrı Dağı:
○

B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
otsu

Yükseklik:
800-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydonozgiller

Bitkinin Adı:
Eryngium billardieri Delar.

Türkçe:
Boğa diken, Çakır diken



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: otsu

Yükseklik: 1400-2500

Çiçekleme Ayları: ○○○○○●○○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydanozgiller

Bitkinin Adı:
Heracleum sphandylum

Türkçe:
Tavşancıl otu,
Baldırgan



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
çok yıllık

Hayat Formu:
otsu

Yükseklik:
1000-1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydonozgiller

Bitkinin Adı:
Ferula communis L.

Türkçe:
Deli çasır



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: otsu

Yükseklik: 1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
İran turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydanozgiller

Bitkinin Adı:
Ferula orientalis L.
subsp. *orientalis*

Türkçe:
Eşek çası



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
otsu

Yükseklik:
1100-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydonozgiller

Bitkinin Adı:
Malabaila secacul
Banks & Sol

Türkçe:
Kelemkessir,
manda



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince): Apiaceae		Familiya (Türkçe): Maydanozgiller		Bitkinin Adı: Torilis arvensis L.		Türkçe: Pıtrak	
							
Ağrı Dağı:	B10:	Yaşı:	Hayat Formu:	Yükseklik:	Çiçekleme Ayları:	Fitocoğrafik Bölge:	Endemizm:
○	○	Tek yıllık	Otsu	600-12000	○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 1 12	Akdeniz	E

Family (Latince):
Apiaceae

Familya (Türkçe):
Maydonozgiller

Bitkinin Adı:
Torilis leptophylla (L.)
Reichb. Pıtrak,

Türkçe:
Pıtrak,
çoçukboğan



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2300

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Famİlya (Türkçe):
Maydonozgİller

Bitkinin Adı:
Tordylium hasslquistiae DC.

Türkçe:
Geyik otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Apiaceae

Famila (Türkçe):
Maydonozgiller

Bitkinin Adı:
Zosima absinthifolia
(Vent.) Link.

Türkçe:
Peynir otu,
Ayıeli



Ağrı Dağı: ☒

B9: ☒

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1400

Çiçekleme Ayları: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Aster amellus L. subsp.
ibericus (STEV.) Avestian

Türkçe:
Kafkas yıldızı



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-2300

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Karadeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Anthemis cotula L.

Türkçe:
Köpek papatyası,
Papatya, Hozan
çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Anthemis tinctoria
L. var. *tinctoria*

Türkçe:
Sarı papatya



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Artemisia austriaca Jacq.

Türkçe:
Kokulu yavşan



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince): Asteraceae	Familya (Türkçe): Topluçiçekgiller	Bitkinin Adı: Achillea biebersteine Afan	Türkçe: Kılıç otu, Anadolu teleme otu, sarı çiçek
---------------------------------	---------------------------------------	---	--



Ağrı Dağı: <input checked="" type="checkbox"/>	B10: <input checked="" type="checkbox"/>	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 950-1900	Çiçekleme Ayları: 1 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 12	Fitocoğrafik Bölge: İran-Turan	Endemizm: E
--	--	---------------------	----------------------	------------------------	---	--------------------------------------	----------------

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Achillea millefolium L. subsp.
millefolium L

Türkçe:
Civanperçemi,
Sancı otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-2100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa
-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Famila (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Achillea tenuifolia Lam.

Türkçe:
Çobankirpiği,
Kirpit



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Achillea wilhelmsii C.Koch

Türkçe:
Çeren, servi otu



Ağrı Dağı: B10: ☒

Yaşı: ☐
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100-1900

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Echinops pungens
Trautv. var. *pungens* .

Türkçe:
Topuz



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-2300

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Iran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Carduus collinus subsp.
cylindricus

Türkçe:
Devediken



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Carduus pycnocephalus L.
subsp. *albidus* (bieb.) Kazmi

Türkçe:
Eşek dikenî, Sık
başlı kangal



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Carduus nigrescens Vill.

Türkçe:
Deve dıkeni



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900--1400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Carduus nutans L.
subsp. *nutans*

Türkçe:
Deve dikenî
Eşek dikenî



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otlu

Yükseklik:
800-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibiry,

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea cheiranthifolia
Willd. var *purpurascens* (DC.)
Wagenitz M. Bieb.

Türkçe:
Acımık Morumsu
peygamber çiçeği



Ağrı Dağı:



B10:



Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Öksin
elementi

Endemizm:

E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea cyanoides

Türkçe:
Peygamber
çiçeği,



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea depressa Bieb.

Türkçe:
Göybaş,
Peygamber
çiçeği, acımık



Ağrı Dağı: B10:



Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2500-2800

Çiçekleme Ayları:



Fitocoğrafik
Bölge:
Öksin
elementi

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea glastifolia

Türkçe:
Sarı peygamber
çiçeği



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea pseudoscabiosa

Türkçe:
Tüylü peygamber
çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1100-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge: İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Centaurea pichleri Boiss.
subsp. *pichleri* Boiss.

Türkçe:
Peygamber
çiçeği



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2400

Çiçekleme Ayları:
1 ○○○○●●○○○○○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Famİlya (Türkçe):
Topluçiçekgİller

Bitkinin Adı:
Centaurea iberica Trev. ex
Sprengel

Türkçe:
Yaban dikenİ,
Çakİrdikenİ,
Çayır dikenİ



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Cichorium intybus L.

Türkçe:
Yabani Hindiiba,
Çitlik



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-3000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Famulya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Cirsium canum (L.) All

Türkçe:
Gangal



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince): Asteraceae	Familya (Türkçe): Topluçığekgiller	Bitkinin Adı: <i>Cnicus benedictus</i> L. var. <i>benedictus</i> L.	Türkçe: Şevketi bostan, Bostanotu, Mübarekdiken
---------------------------------	---------------------------------------	---	--



Ağrı Dağı: ○	B10: ○	Yaşı: Tek yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 1100	Çiçekleme Ayları: ○○○●●○○○○○	Fitocoğrafik Bölge: -	Endemizm: E
					1 12		

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Crupin crupiastrum (Moris) Vis.

Türkçe:
Adı
Gelindöndüren



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
9001400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Chiliophyllum (Ficsh & Meyer)
Schultz Bip var. *chiliopyllum*

Türkçe:
Çeren,
ormandere,
yavşan



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1670-3200

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Helichrysum arenarium (L.)
Moench subsp. (C. Koch)
Davis & Kupich

Türkçe:
Pembemsi ölmez
çiçek,
Yayla çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1250-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

42

Family (Latince):
Asteraceae

Famila (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
İnula oculus-christi L.

Türkçe:
Yünlü pirekiran



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○

Çok yıllık


Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibiriya

Endemizm:
E

Family (Latince): Asteraceae	Familya (Türkçe): Topluçiçekgiller	Bitkinin Adı: <i>Jurinella moschus</i> (Habl.) ssp <i>pinnatisecta</i> (Boiss.) Danina & Davis var. <i>ağrıdağensis</i> Y.Z	Türkçe: Ağrıdağı gazan kulpu			
						
Ağrı Dağı: B10: <input checked="" type="checkbox"/>	Yaşı: <input checked="" type="checkbox"/> Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 2500-3500	Çiçekleme Ayları: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 1 12	Fitocoğrafik Bölge: -	Endemizm: Yeni Tür

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Serratula serratuloides

Türkçe:
Gerçek topbaş



Ağrı Dağı: B10:
☒

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1900-2000

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Senecio vernalis Waldst.
Et Kit.

Türkçe:
Ekin otu,
Pisik otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800- 3000

Çiçekleme Ayları:
○○○●●●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Scorzonera crocifolia

Türkçe:
Burçalak, Yemlik



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 850-2000

Çiçekleme Ayları: ○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Scorzonera semicana DC. ,

Türkçe:
Yemlik, gilekoçuk,
gizer



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1700

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Scorzonera hieraciifolia

Türkçe:
Dedesakalı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: B10:
○

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Scorzonera rigida Aucher

Türkçe:
Havuç



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
950-2650

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Scorzonera mollis Bieb subsp.
mollis Bieb.

Türkçe:
Burçak,
Katırtırnağı



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Lactuca serriola L.

Türkçe:
Acımarul,
Yabani marul



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
iki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1750

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Leontodon crispus Vill.
(Syn.*L. asperimus*)

Türkçe:
Aslandışı



Ağrı Dağı: B10: ☒

Yaşı: ☒
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2200

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Leontodon hispidus L.

Türkçe:
Aslandışı



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
✓ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2000-2800

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Pilosella echioides (Lumn.)
C.H.&FW.Schultz.

Türkçe:
Sarı atmaca otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Taraxacum officinale L.

Türkçe:
Karahindiba,
Adı aslandışı



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Taraxacum fedtschenkoi
Hand.- Mazz.

Türkçe:
Hapşuruk otu,
Zincir otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Taraxacum scaturiginosum
G.Hadl.

Türkçe:
Boylu
karahindiba



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2500

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Tanacetum abrotanifolium (L.)
Druce

Türkçe:
Ala renkli
solucan otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
✓ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Iran Turan

Endemizm:
E

Family (Latince): Asteraceae	Familya (Türkçe): Topluçiçekgiller	Bitkinin Adı: <i>Tanacetum chiliophyllum</i> (Ficsh. & Meyer) Schultz Bip. var. <i>chiliophyllum</i>	Türkçe: Çeren, ormadere, yavşan
---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------



Ağrı Dağı: <input checked="" type="radio"/>	B10: <input type="radio"/>	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 1670-3200	Çiçekleme Ayları: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Fitocoğrafik Bölge: -	Endemizm: <input type="checkbox"/>
					1 12		

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Tanacetum nitens
(Boiss. & Noe) Grierson

Türkçe:
Pire otu,
Solucan otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-1600

Çiçekleme Ayları: ○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Tanacetum parthenium(L.)
Schultz Bipo.

Türkçe:
Gümüüşdüğme



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Tragopogon bubhthalmoides
(DC.) Boiss. var. *latifolius*

Türkçe:
Yemlik



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Tragopogon pteroides Panc.

Türkçe:
Teke sakalı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: İki yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1500

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Akdeniz

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Asteraceae

Familiya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Tussilago farfara L.

Türkçe:
Devetabanı,
Kabalak



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1400-2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Xeranthemum annuum L.

Türkçe:
Süpürge otu,
Dağ karanfili



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Asteraceae

Familya (Türkçe):
Topluçiçekgiller

Bitkinin Adı:
Xeranthemum longipapposum
FISCH. ET MEY.

Türkçe:
Süpürge otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Betulaceae

Familya (Türkçe):
Huşagaçgiller

Bitkinin Adı:
Betula pendula Roth.

Türkçe:
Adı Huş



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: ağaç

Yükseklik: 1300-3000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Berberidaceae

Familya (Türkçe):
Kadıntuzluğiller

Bitkinin Adı:
Berberis vulgaris L.

Türkçe:
Kadın tuzluğu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
800-1850

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Alkana orientalis (L.)
Boiss. var. *orientalis*

Türkçe:
Sarı havaciva
otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Anchusa azurea Miller var.
azurea Miller.

Türkçe:
Gök mavisi
sığırdili, güriz



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Asperugo procumbens L.

Türkçe:
Boya kökü



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2200

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Buglossoides arvensis (L.)
Johnston

Türkçe:
Taşkesen otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2500

Çiçekleme Ayları:
○●●●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Cerinthe minor L.

Türkçe:
Küçük mum
çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
2 ve çok
yıllık,

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Cynoglossum montanum L.

Türkçe:
Dağ köpekdili



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Echium italicum L.

Türkçe:
Bal çiçeği,
Engerek otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1950

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Akdeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familiya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Echium russicum İ. F. GMELİN

Türkçe:
Engerek otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Heliotropium europaeum L.

Türkçe:
Bozot



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Lappula squarosa (Retz)
Dumort

Türkçe:
Lappula



Ağrı Dağı: B10:
☒

Yaşı:
iki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2200

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

<i>Family (Latince):</i> Boraginaceae	<i>Familya (Türkçe):</i> Hodangiller	<i>Bitkinin Adı:</i> Myosotis olympica Boiss.	<i>Türkçe:</i> Uludağ sevdaçiçeği, Uludağ Unutmabenişi
--	---	--	---



<i>Ağrı Dağı:</i> ○	<i>B10:</i> ○	<i>Yaşı:</i> İki yıllık	<i>Hayat Formu:</i> Otsu	<i>Yükseklik:</i> 1300-2200	<i>Çiçekleme Ayları:</i> ○○○●●●●○○○ 1 12	<i>Fitocoğrafik Bölge:</i> -	<i>Endemizm:</i> E
------------------------	------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Myosotis lithospermifolia
(Willd.) Homem

Türkçe:
Sedefotu,
Yapraklı
unutma beni



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Karadeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Nonea pulla L.(DC.)subsp.
scabrisquamata A.Baytop

Türkçe:
Sormuk



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Onosma nigricaula H. Riedi

Türkçe:
Sormuk



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2200

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Boraginaceae

Familiya (Türkçe):
Hodangiller

Bitkinin Adı:
Onosma procerum Boiss.

Türkçe:
Emzik otu



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2300

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Barbarea plantaginea DC. k

Türkçe:
Sinir otuna
benzer Nicer otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Alyssum montanum subsp.
montanum

Türkçe:
Kuduz otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Erysimum alpestre
Kotschy ex Boiss.

Türkçe:
Kaplan pençesi



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince): Brassicaceae	Familya (Türkçe): Hardalgiller	Bitkinin Adı: Erysimum hamosum Blanche ex Posti.	Türkçe: Çengelli Kaplan Pençes
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------



Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Erysimum senoneri (Heldr. &
Sart.) Wettst. subsp.
icaricum snog

Türkçe:
İkar yunan otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Cardaria draba(L.)Desv.subsp.
draba(L.)Desv.

Türkçe:
Çok yıllık
kır teresi,
Deniz lahanası



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Cardamine lazica Boiss&
Balansae

Türkçe:
Tüylü su teresi



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
Çok yıllık


Hayat Formu:
Rizomlu

Yükseklik:
1000- 1950

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Karadeniz

Endemizm:
E

<i>Family (Latince):</i> <i>Brassicaceae</i>	<i>Familya (Türkçe):</i> <i>Hardalgiller</i>	<i>Bitkinin Adı:</i> <i>Crambe orientalis L.</i>	<i>Türkçe:</i> <i>Deniz</i> <i>lahanası, Gelinteli</i>
			
<i>Ağrı Dağı:</i> ○	<i>B10:</i> ○	<i>Yaşı:</i> Çok yıllık	<i>Hayat Formu:</i> Otsu
<i>Yükseklik:</i> 950-1500	<i>Çiçekleme Ayları:</i> ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 1 12		<i>Fitocoğrafik Bölge:</i> Iran-Turan <i>Endemizm:</i> E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Fibigia macrocarpa (Boiss.)
Boiss.

Türkçe:
Çüneş otu



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Hesperis matronalis L.

Türkçe:
Gece gündüz
çiçeği



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Famila (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Hirschfeldia incana

Türkçe:
Deli turp, Melez
hardal



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-


Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Famİlya (Türkçe):
Hardalgİller

Bitkinin Adı:
İsatis candolleana Boiss.

Türkçe:
Boya otu



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran- Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Lepidium vesicarium L.

Türkçe:
Aş pençeri,
Tere otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Peltaria angustifolia DC

Türkçe:
Kalkan çiçek



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Famİlya (Türkçe):
Hardalgİller

Bitkinin Adı:
Rapistrum rugosum (L.)All.

Türkçe:
Türpenk



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Brassicaceae

Familya (Türkçe):
Hardalgiller

Bitkinin Adı:
Rindera lanata var. *lanata*

Türkçe:
Yünlü gelin



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Brassicaceae

Famİlya (Türkçe):
Hardalgİller

Bitkinin Adı:
Sinaps arvensis L.var.orientalis

Türkçe:
Yaban hardalı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Campanulaceae

Familya (Türkçe):
Çançiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Campanula glomerata L.
subsp. *hispida*

Türkçe:
Topbaş çan
çiçeği



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-2100

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Campanulaceae

Familya (Türkçe):
Çançiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Campanula stevenii M.Bieb

Türkçe:
Çan çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Campanulaceae

Familya (Türkçe):
Çançiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Campanula troegerae
Damboldt

Türkçe:
Artvin çan çiçeği



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caprifoliaceae

Famİya (Türkçe):
Hanımeliidiller

Bitkinin Adı:
Lonicera caucasica Pallas
subsp. *orientalis* (Lam.)
Chamb.& Long .

Türkçe:
Kafkas hanımeli



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caprifoliaceae

Familya (Türkçe):
Hanımeliidiller

Bitkinin Adı:
Lonicera xylosteum L.

Türkçe:
Hanımeli



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caprifoliaceae

Familya (Türkçe):
Hanımeliidiller

Bitkinin Adı:
Viburnum lantana L.

Türkçe:
Germeşo



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 1900-2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Arenaria leptoclados L.

Türkçe:
Kum otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1600

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Cerastium arvense L.

Türkçe:
Boynuz otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Cerastium berringianum

Türkçe:
Alpin yapışkan
boynuz otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-2000

Çiçekleme Ayları: ○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Cerastium tomentosum

Türkçe:
Boynuz otu,
Farekulağı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700-3000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familiya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Dianthus artwinensis

Türkçe:
Artvin karanfili



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
✓

Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100-1500

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Famila (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Dianthus spiculifolius

Türkçe:
Beyaz karanfil



Ağrı Dağı:
○

B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Dianthus zonatus var. zonatus

Türkçe:
Halkalı Karanfil



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1400-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familiya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Gypsophila cerastoides

Türkçe:
Çöven



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2000-2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Herniaria glabra L.

Türkçe:
Kaşık otu, çıplak
kırılma otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Minuartia erythrosephala
(Boiss.) Hard-Mazz. var.
erythrosephala (Boiss.) Hand.-

Türkçe:
Kırmızı sepallı
koru otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1800-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene alba (MILLER) KRAUSE
subsp. *divaricata* (REICHB.)
WALTERS,

Türkçe:
Garagile,
yapışkan otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene arguta Fenzl.

Türkçe:
Gicime,
Yapışkan otu



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı: Çok yıllık
✓

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1800

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene gallica L.

Türkçe:
Güzel
yapışkan otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100-2100

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene conica L.

Türkçe:
Konik
yapışkan otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene inclinata Hub.-Mor.

Türkçe:
Eğik
yapışkan otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
D.Akdeniz.

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familiya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene latifolia

Türkçe:
Yapışkan otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
950-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene viscosa(L.)Pers

Türkçe:
Tüylü çiçek
yapışkanotu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge: -

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familiya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene vulgaris Moench
Gorcke var. *commutata* (Guss.)
Coode et Cullen

Türkçe:
Gıvışkan otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○

Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Silene vulgaris (Moench)
Garcke

Türkçe:
Gıvışkan,
Gelinparmağı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Caryophyllaceae

Familiya (Türkçe):
Karanfilgiller

Bitkinin Adı:
Stellaria media (L.)
Vill. subsp. media

Türkçe:
Yıldız otu,
Çinçilim



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2000

Çiçekleme Ayları:
○○●●●●●●○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Chenopodiaceae

Famila (Türkçe):
Kazayağıgiller

Bitkinin Adı:
Chenopodium ficifolium SM.

Türkçe:
Kazayağı, sirken



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1300

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Chenopodiaceae

Famila (Türkçe):
Kazayağıgiller

Bitkinin Adı:
Chenopodium folisum
(Moench) Aschers.

Türkçe:
İt üzümü



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Chenopodiaceae

Familya (Türkçe):
Kazayağıgiller

Bitkinin Adı:
Kochia prostrata (L.) Schrad

Türkçe:
Adi bozkırotu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1000,

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Chenopodiaceae

Familya (Türkçe):
Kazayağıgiller

Bitkinin Adı:
Salsola dendroides Pall.

Türkçe:
Deve kıran



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 800-850

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
İran -Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Convolvulaceae

Familya (Türkçe):
Sarmaşıkgiller

Bitkinin Adı:
Convolvulus arvensis L.

Türkçe:
Sarmaşık,
Dolaşkan



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Convolvulaceae

Familya (Türkçe):
Sarmaşıkgiller

Bitkinin Adı:
Convolvulus galaticus Rostan
ex Choisy

Türkçe:
Boz tarla
sarmaşığı



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Crassulaceae

Familya (Türkçe):
Damkörüğüiller

Bitkinin Adı:
Hylotelephium telephium (L.)
H.Ohba

Türkçe:
Camişgulağı



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Crassulaceae

Familya (Türkçe):
Damkоруğugiller

Bitkinin Adı:
Rosularia chrysantha (Boiss.)
Tahkt.

Türkçe:
parmak otu



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700-2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Crassulaceae

Familya (Türkçe):
Damkоруğugiller

Bitkinin Adı:
Sedum lydium Boiss

Türkçe:
Kaya kоруğu,
Damkоруğu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Crassulaceae

Familya (Türkçe):
Damkоруğugiller

Bitkinin Adı:
Sedum pilusum

Türkçe:
Kaya kоруğu,
Damkоруğu



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Cucurbitaceae

Familya (Türkçe):
Kabakgiller

Bitkinin Adı:
Bryonia aspera Stev. ex Ledeb.
(Syn. *B. alba*)

Türkçe:
Çitkabağı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1600

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Cucurbitaceae

Familya (Türkçe):
Kabakgiller

Bitkinin Adı:
Bryonia dioica

Türkçe:
Çitkökü, Çit
kabağı, itkabağı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Cyperaceae

Familya (Türkçe):
Papyrusgiller

Bitkinin Adı:
Blysmus compressus (L.)
Panzer ex Link.

Türkçe:
Çayır yassı sazi



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-2500

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-


Endemizm:
E

Family (Latince):
Cupressaceae

Familya (Türkçe):
Servigiller

Bitkinin Adı:
Juniperus communis L.subsp.
communis L.

Türkçe:
Apın adı ardıcı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
2000-3000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Cupressaceae

Familya (Türkçe):
Servigiller

Bitkinin Adı:
Juniperus communis L.
saxatilis Pall.

Türkçe:
Adı ardıç



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Ağaç

Yükseklik: 1200-3600

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Cupressaceae

Familiya (Türkçe):
Servigiller

Bitkinin Adı:
Juniperus excelsa Bieb.

Türkçe:
Ekselsa ardıcı



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1200-1400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran -Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Cuscutaceae

Familya (Türkçe):
Cinsaçıgiller

Bitkinin Adı:
Cuscuta planiflora Ten.

Türkçe:
Küsküt otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 700-1700

Çiçekleme Ayları:
1 ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Cuscutaceae

Familya (Türkçe):
Cinsaçgiller

Bitkinin Adı:
Cuscuta babylonica Aucher ex
Cholsy var. *babylonica* Aucher
ex Cholsy

Türkçe:
Küsküt otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Dipsacaceae

Familya (Türkçe):
Fescitarağigiller

Bitkinin Adı:
Scabiosa argentea L.

Türkçe:
Gıcık otu Uyuz
otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Dipsacaceae

Familya (Türkçe):
Fescitarağıgiller

Bitkinin Adı:
Scabiosa caucasica M.Bieb
(S.Alba)

Türkçe:
Kafkas uyuz otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa -
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Dipsacaceae

Familya (Türkçe):
Fescitarağıgiller

Bitkinin Adı:
Cephalaria prosera
Fisch. & Lall.

Türkçe:
Gevrek, Yüksek
peleminir



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-2500

Çiçekleme Ayları: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Fitocoğrafik Bölge: Avrupa - Sibirya

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Euphorbiaceae

Famlyla (Türkçe):
Sütlegengiller

Bitkinin Adı:
Euphorbia seguieriana Necker
subsp. *seguieriana*

Türkçe:
Sütleyen



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Euphorbiaceae

Familya (Türkçe):
Sütleğengiller

Bitkinin Adı:
Euphorbia serrata var serrata

Türkçe:
serrat yapraklı
sütlegen



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-1300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Euphorbiaceae

Familya (Türkçe):
Sütlegengiller

Bitkinin Adı:
Euphorbia myrsintes L.

Türkçe:
Yatık sütlegen



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1650

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Euphorbiaceae

Familya (Türkçe):
Sütlegengiller

Bitkinin Adı:
Euphorbia orientalis L.

Türkçe:
Sütlegen



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Ephedraceae

Familya (Türkçe):
Denizüzümügiller

Bitkinin Adı:
Ephedra distachya

Türkçe:
Ebu Cehil



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 800-1000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ephedraceae

Familya (Türkçe):
Denizüzümügiller

Bitkinin Adı:
Ephedra major Host. T.y.

Türkçe:
Deniz üzümü



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1850

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus aduncus Willd.

Türkçe:
Kaңçalı geven



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: Akdeniz

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus antalyensis

Türkçe:
Antalya geveni



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-1900

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus alyssoides Lam.

Türkçe:
Korungaya
benzer given



Ağrı Dağı: B10:
☉

Yaşı:
☉ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1700

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus davisii Chamb.et
Matthews.

Türkçe:
Davisii geveni



Ağrı Dağı: B10: ☒

Yaşı: ☒
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1800-2600

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Famİlya (Türkçe):
Baklagİller

Bitkinin Adı:
Astragalus bicolor Lam.

Türkçe:
Geven



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1300

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus declinatus Willd.

Türkçe:
Geven, yonca



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600 2900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Famİlya (Türkçe):
Baklagİller

Bitkinin Adı:
Astragalus eriocephalus Willd.
subsp. *eriocephalus* Willd.

Türkçe:
Çok başlı geven



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
2100-2400

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus cicer L.

Türkçe:
Nohut yaprak
geven



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familiya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus cedreticola
A. Duran & Podlech

Türkçe:
Kırmızı çiçekli
geven



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus chaldiranicus Kit
Tan & Sorger

Türkçe:
Çaldıran geveni



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus psedoutriger
Grossh.

Türkçe:
Geven



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 2000-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus pinetorum Boiss.

Türkçe:
Orman geveni



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100-1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Famİlya (Türkçe):
Baklagİller

Bitkinin Adı:
Astragalus hirticalyx

Türkçe:
Geven



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○

Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1400-1700

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Famİlya (Türkçe):
Baklagİller

Bitkinin Adı:
Astragalus fumosus

Türkçe:
Geven



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince): Fabaceae	Famİlya (Türkçe): Baklagİller	Bitkinin Adı: Astragalus hyalolepis Bunge.	Türkçe: Şeffaf pullu geven, yonca				
							
							
Ağrı Dağı: <input checked="" type="radio"/>	B10: <input type="radio"/>	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 1250-1900	Çiçekleme Ayları: ○○○○●●○○○○ 1 12	Fitocoğrafik Bölge: -	Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus odoratus Lam.,

Türkçe:
Sarı geven



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Astragalus vesicaris L.subsp.
ağrıdağensis Y.Z.

Türkçe:
Ağrı Dağı Geveni



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1900

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: Yeni tür

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Coronilla minima L.subsp.
Lotoides

Türkçe:
Korunga



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familiya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Coronilla varia L. subsp. varia L.

Türkçe:
Renkli burçak



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Glycyrrhiza glabra L.

Türkçe:
Meyan



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Medicago sativa L.

Türkçe:
Yonca



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 850-1650

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Melilotus officinalis(L.)Desr.

Türkçe:
Eşek yoncası,
Kokulu sarı yonca



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Sophora alopecuroides L. var.
alopecuroides L.

Türkçe:
Acı meyan,
Sofora



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-1000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Famlyla (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Trifolium arvense L.

Türkçe:
Tarla üçgülü



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Famİlya (Türkçe):
Baklagİller

Bitkinin Adı:
Trifolium davissi Hossain

Türkçe:
Davis üçgülü



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-2000

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Trifolium campestre Schreb.

Türkçe:
Altuni üçgül,
üzüm



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Famİlya (Türkçe):
Baklagİller

Bitkinin Adı:
Trifolium montanum L. subsp.
humboldtianum (A. BR.et
Aschers.) Hossain

Türkçe:
Dağ üçgülü



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1800-2400

Çiçekleme Ayları:
○○○○○○○●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Trifolium pratense L.

Türkçe:
Çayır üçgülü



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2000

Çiçekleme Ayları: ○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Trifolium pratense L. var.
pratense Boiss. & Bal.

Türkçe:
Eşek yoncası,
Üçkulak otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2100

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Lathyrus cicera L

Türkçe:
Kırmızı
mürdümük



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familiya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Lathyrus karsianus P.H.Davis

Türkçe:
Kars Mürdümüğü



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1350-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya


Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Lathyrus rotundifolius Wild.

Türkçe:
Kırmızı
mürdümük



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Onobrychis araxina Schisch.

Türkçe:
Aras korungası



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Abaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Onobrychis radiata(Desf.) Bieb.

Türkçe:
Aleme çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Fabaceae

Familiya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Onobrychis viciifolia Scop.

Türkçe:
Korunga,
gorulgan



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Vicia sativa L.subsp.sativa L.

Türkçe:
Adi fiğ



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Fabaceae

Familya (Türkçe):
Baklagiller

Bitkinin Adı:
Vicia villosa Roth.subsp.
eriocarpa (Hausskn.) P.W.Ball.

Türkçe:
Bakla,
Tüylü üçgül



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 950-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Gentianaceae

Famlya (Türkçe):
Centiyanagiller

Bitkinin Adı:
Gentiyana oliveri Griseb Afat

Türkçe:
Centyana



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-2300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Geraniaceae

Familya (Türkçe):
Turnagagasigiller

Bitkinin Adı:
Erodium chrysanthum

Türkçe:
Çoban döndüren,
Krizantem



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Akdeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Geraniaceae

Familya (Türkçe):
Turnagagasıgiller

Bitkinin Adı:
Erodium cicutarium (L.) Hert.
subsp.cicutarium (L.) Hert.

Türkçe:
Leylekgagası,
iğnecik, Dönbaba



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Geraniaceae

Familya (Türkçe):
Turnagagasigiller

Bitkinin Adı:
Geranium asphodeloides
Burm. Fil.,

Türkçe:
Turnagagası



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 2300-2600

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Geraniaceae

Famlya (Türkçe):
Turnagagasigiller

Bitkinin Adı:
Geranium tuberosum L.
subsp. *tuberosum* L.

Türkçe:
Tavşantopu,
Yumrulu
tavşantotu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Geraniaceae

Familya (Türkçe):
Turnagagasigiller

Bitkinin Adı:
Geranium macrostylum Boiss

Türkçe:
Turnagagası



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1900

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
D. Akdeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Hypericaceae

Familya (Türkçe):
Binbirdelikotugiller

Bitkinin Adı:
Hypericum montbretii Spach.

Türkçe:
Çay otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1750

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Hypericaceae

Familya (Türkçe):
Binbirdelikotugiller

Bitkinin Adı:
Hypericum perforatum L.

Türkçe:
Kantaron çiçeği,
Ülser otu, Çayotu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 900-2500

Çiçekleme Ayları: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik Bölge: Avrupa-Sibya

Endemizm: E

Family (Latince): <i>Iridaceae</i>	Familya (Türkçe): <i>Süsengiller</i>	Bitkinin Adı: <i>Gladiolus atrovioleaceus Boiss.</i>	Türkçe: <i>Glavor</i>
			
Ağrı Dağı: <input type="radio"/>	B10: <input type="radio"/>	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu
Yükseklik: 650-2150	Çiçekleme Ayları: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Fitocoğrafik Bölge: -
1	12	Endemizm: <input type="checkbox"/>	

Family (Latince):
İridaceae

Familya (Türkçe):
Süsengiller

Bitkinin Adı:
Gladiolus kotschyanus Boiss

Türkçe:
Glavor, Papak otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2150

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
İridaceae

Familya (Türkçe):
Süsengiller

Bitkinin Adı:
İris spuria L.subsp.
musulmanica (Fomin.) Takht.

Türkçe:
Müslüman
süseni



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Iridaceae

Familya (Türkçe):
Süsengiller

Bitkinin Adı:
*İris iberica Hoffm.subsp.
elegantissima (Sosn.)
Takht.& Federov*

Türkçe:
Kurtkulağı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1100-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
İllecebraceae

Famulya (Türkçe):
Kırıkotugiller

Bitkinin Adı:
Scleranthus annus L.

Türkçe:
Yıllık yumak otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Akdeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Lamium album L.

Türkçe:
Beyaz çiçekli
ballıbaba



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Lamium maculatum L.var.
villosifolium R.Mill.

Türkçe:
Tüylü ballıbababa



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1400-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Ajuga chamaepitys (L.)
Schreber subsp. *chia*
(Schreber) Arcangeli var. *Chia*

Türkçe:
Mayasilotu,
acıgıc



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1400-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Ajuga chamaepitys (L.) subsp.
laevigata (Banks et Sol.)
P.H.Davis

Türkçe:
Mayasilotu,
Tüysüz yerçami



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Ajuga orientalis L.

Türkçe:
Mayasıl otu,



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Eremostachys laciniata (L.)
Bunge

Türkçe:
Yırtmaç yapraklı
tekbaşak



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Phlomis tuberosa L.

Türkçe:
Pamuk dağı yel
otu



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-1500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Nepeta racemosa L. .

Türkçe:
Kedi nanesi



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Nepeta transcaucasica Grossh

Türkçe:
Kafkasya
kedinanesi



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Teucrium polium L.

Türkçe:
Taşkekiği, Bodur
otu, kısamahmut



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1400-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince): Lamiaceae	Familiya (Türkçe): Ballıbabagiller	Bitkinin Adı: Thymus praecox Opiz. subsp. caucasicus (Ronniger) J alas. var. grossheimii (Ronniger) J alas	Türkçe: Keklik otu, Kekotu, kekik				
							
Ağrı Dağı: ○	B10: ○	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Yarı çalı	Yükseklik: 1000-3600	Çiçekleme Ayları: ○○○○●●○○○ 1 12	Fitocoğrafik Bölge: -	Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Thymus transcaucasicus
Ronniger

Türkçe:
Kekik, Kekotu,
Keklik otu



Ağrı Dağı: B10:



Yaşı:



Çok yıllık

Hayat Formu:

Yarı çalı

Yükseklik:

1200-2250

Çiçekleme Ayları:



1

12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibiriya
(Kafkasya)

Endemizm:

Nadir

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Thymus kotschyanus Boiss. &
Hohen.subsp.glabrescens
Boiss.

Türkçe:
Kekik, kekotu,
keklik otu



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Yarı çalı

Yükseklik: 1300-2400

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Thymus fallax Ficsh. & Mey.

Türkçe:
Kekik, Keklik otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Yarı çalı

Yükseklik: 1500-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
Kafkasya

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Acinos alpinus subsp. *alpinus*

Türkçe:
Alpin Acınotu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2400

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Famİlya (Türkçe):
Ballıbabagİller

Bitkinin Adı:
Salvia cassia Samuelss ex
Rech.Fil.

Türkçe:
Yayladağı
adaçayı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Salvia hydrangea

Türkçe:
Ağrı adaçayı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1900-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Salvia nemrosa L.

Türkçe:
Çöl çayı,
Ada çayı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
☑

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
İran -Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Salvia huberi Helge

Türkçe:
Ada çayı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1100-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Salvia limbata C.M.Meyer

Türkçe:
Maldili



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Salvia verbenaca L

Türkçe:
Demirotumsu
adaçayı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1100-1500

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Scutellaria orientalis subsp.
santolinoides (Hausskn. ex
Bornm.) Edmondson

Türkçe:
Doğu adaçayı



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1330

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Iran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Stachys annua (L.) L.subsp.
annua var *lycaonica*
Bhattacharjee

Türkçe:
Dağ çayı



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1100-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Stachys iberica Bieb.subsp.
iberica var.*densipilosa*
Bhattacharjee

Türkçe:
Dağ çayı



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Familya (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Stachys lavandulifolia Vahl. var.
lavandulifolia

Türkçe:
Dağ çayı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-3600

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Lamiaceae

Famlyla (Türkçe):
Ballıbabagiller

Bitkinin Adı:
Ziziphora clinopodioides Lam.

Türkçe:
Merze, Reyhan



Ağrı Dağı: B10:
☒

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1300

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Allium akaka S.G.Gmelin

Türkçe:
Yabani sarımsak



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-1800

Çiçekleme Ayları:
1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Allium ağrıdağensis(armenum)
Boiss.&Kotschy. Et Y.Z.

Türkçe:
Ağrı dağı
sarımsağı



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2000

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familiya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Allium balansae

Türkçe:
Balansae soğanı



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1600

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familiya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
allium cardiostemon
Fisch.& Mey.

Türkçe:
Silim soğanı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Allium hirtifolium Boiss.var.
hirtulum Regel

Türkçe:
Tüylü yapraklı
soğan



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
✓

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1580-2600

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Allium incisum Fomin

Türkçe:
Kaya soğanı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1650-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince): Liliaceae	Familya (Türkçe): Zambakgiller	Bitkinin Adı: Asparagus persicus Baker	Türkçe: Ağrıdağı kuşkonmazı, Meleşçöyüt				
							
Ağrı Dağı: ○	B10: ○	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 800-1700	Çiçekleme Ayları: ○○○○●○○○○○ 1 12	Fitocoğrafik Bölge: İran -Turan	Endemizm: E

Family (Latince):
Linaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Bellevia gracilis Feinbrun

Türkçe:
Dağ sümbülü



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Linaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Bellevalia fominii Woronov

Türkçe:
Dağ sümbülü



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1700-2300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Colchicum szovitsii Fisch. &
Mey. subsp. *szovitsii*

Türkçe:
Karçiçeği,
Danagıran



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1700-2700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Linaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Fritillaria caucasica J. F. Adam

Türkçe:
Kafkas Terslalesi



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: B10:
☑ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Hirkan-
Karadeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familiya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Gagea luteoides Stapf.

Türkçe:
Sarı yıldız,
Altın yıldız



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1400-3000

Çiçekleme Ayları:
○○●●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Gagea peduncularis

Türkçe:
Altın yıldız



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-2050

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Linaceae

Familiya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Scilla sibirica Haw.

Türkçe:
Sibirya dağ
soğanı



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1600-3500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Linum tenuifolium

Türkçe:
Zarif Yapraklı
Keten, Zeyzek



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○○○●●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Linaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Muscari comosum (L.) Miller

Türkçe:
Arap sümbülü,
Arap taşığı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Akdeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Muscari neglectum Guss.

Türkçe:
Gavur nergisi,
Arapotu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Liliaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Puschkinia ssilloides Adams

Türkçe:
Kardelen



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Linaceae

Famlyla (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Ornithogalum narbonense

Türkçe:
Akyıldız,
Tükrükotu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1200-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Linaceae

Familya (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Ornithogalum nutans L.

Türkçe:
Akyıldız,
Tükrük otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Liliaceae

Famlyla (Türkçe):
Zambakgiller

Bitkinin Adı:
Ornithogalum oligophyllum
E.D.Clark

Türkçe:
Kurtsoğanı



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1800

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince): Linaceae	Familya (Türkçe): Zambakgiller	Bitkinin Adı: Ornithogalum pereniaceum L.	Türkçe: Akyıldız, pirene Tükrük otu
-------------------------------	-----------------------------------	--	---



Ağrı Dağı: ○	B10: ○	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 1200-2500	Çiçekleme Ayları: ○○○○○●●○○○○○ 1 12	Fitocoğrafik Bölge: -	Endemizm: E
-----------------	-----------	---------------------	----------------------	-------------------------	---	-----------------------------	----------------

Family (Latince):
Malvaceae

Familya (Türkçe):
Ebegümecigiller

Bitkinin Adı:
Abutilon theophrasti Medic.

Türkçe:
İmam kavağı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Malvaceae

Familya (Türkçe):
Ebegümecigiller

Bitkinin Adı:
Althaea officinalis L.

Türkçe:
Gülhatmi



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Malvaceae

Familya (Türkçe):
Ebegümecigiller

Bitkinin Adı:
Alsea calverti Boiss.

Türkçe:
Hatmi çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
700-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Malvaceae

Familya (Türkçe):
Ebegümecigiller

Bitkinin Adı:
Malva neglecta Waqllr

Türkçe:
Ebegümeci



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Malvaceae

Familya (Türkçe):
Ebegümecigiller

Bitkinin Adı:
Malva nicaensis All.

Türkçe:
Ebegümeci



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Orchidaceae

Familya (Türkçe):
Salepgiller

Bitkinin Adı:
Orchis coriophora (syn.
Anacamptis coriophora)

Türkçe:
Doğu salebi



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Orchidaceae

Familya (Türkçe):
Salepgiller

Bitkinin Adı:
Orchis mascula (L.) L. subsp.
longicalcarata

Türkçe:
Sümbül, Çam
Erkil Salebi



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Orobanchaceae

Familiya (Türkçe):
Canavarotugiller

Bitkinin Adı:
Orobanche aegyptica Pers.

Türkçe:
Mısır Canavar
otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Orobanchaceae

Familya (Türkçe):
Canavarotugiller

Bitkinin Adı:
Orobanche anatolica

Türkçe:
Anadolu
çanavar otu



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Orobanchaceae

Familya (Türkçe):
Canavarotugiller

Bitkinin Adı:
Orbanche cernua
f. *typica* Boiss.

Türkçe:
Mavimsi
canavar otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Orobanchaceae

Familya (Türkçe):
Canavarotugiller

Bitkinin Adı:
Orobanche elatior Sutton

Türkçe:
Boylu Canavar
otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2200

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Orobanchaceae

Familya (Türkçe):
Canavarotugiller

Bitkinin Adı:
Phelypaea coccinea
(Bieb.) Poiret

Türkçe:
Kardeşkanı,
Horoz gülü



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Glaucium corniculatum
(L.) Rud.

Türkçe:
Kırmızı boynuzlu
gelincik



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Bir iki
yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Glaucium leiocarpum Boiss.

Türkçe:
Boynuzlu
gelincik



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver pinnatifidum Moris.

Türkçe:
Beşparmak
gelincik



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver apokrinomenon
Fedde

Türkçe:
Çöl lalesi
Kel lale



Ağrı Dağı: B10: ☒

Yaşı: ☒
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1900

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver dubium L.

Türkçe:
Meşkül haşhaşı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver rhoeas L.

Türkçe:
Gelincik



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver fugax Poidet var.
platydicus Cullen

Türkçe:
Kıllı gelincik



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700-2000

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familiya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver pseudo-orientale

Türkçe:
Ala haşhaş
Yabani haşhaş



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Papaveraceae

Familya (Türkçe):
Haşhaşgiller

Bitkinin Adı:
Papaver orientale L.

Türkçe:
Doğu haşhaşı
Yabani haşhaş



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1400-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Primulaceae

Familya (Türkçe):
Çuhaçiçeğiğiller

Bitkinin Adı:
Anagallis arvensis L. var.
caerulea

Türkçe:
Fare kulağı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Akdeniz

Endemizm:
E

Family (Latince):
Primulaceae

Familya (Türkçe):
Çuhaçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Primula auriculata Lam.

Türkçe:
Mustafa çiçeği,
Ayıkulağı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1250-3150

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
☐

Family (Latince):
Primulaceae

Familya (Türkçe):
Çuhaçiçeğiğiller

Bitkinin Adı:
Primula veris sbsp. *macrocalyx*

Türkçe:
İri çuhaçiçeği,
Ayrançiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Primulaceae

Familya (Türkçe):
Çuhaçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Primula elator (L.) Hill. subsp.
meyeri

Türkçe:
Çuha çiçeği



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2000-2800

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Plantaginaceae

Famlyla (Türkçe):
Sinirotugiller

Bitkinin Adı:
Plantago lanceolata L.

Türkçe:
Lanset şekilli sinir
otu, Gılıçotu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Plantaginaceae

Familya (Türkçe):
Sinirotugiller

Bitkinin Adı:
Plantago major L.

Türkçe:
Sinir otu,
Bağa yaprağı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●●○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Plantaginaceae

Familiya (Türkçe):
Sinirotugiller

Bitkinin Adı:
Plantago media L.

Türkçe:
Kılıçotu, Tıbbi
sinirotu,



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-1800

Çiçekleme Ayları: ○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Plumbaginaceae

Familya (Türkçe):
Dişotugiller

Bitkinin Adı:
Acantholimon calvertii

Türkçe:
At geveni, Ağrı
dağı Çoban
yastığı



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 1300-2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Plumbaginaceae

Famİlya (Türkçe):
Dişotugiller

Bitkinin Adı:
Plumbago europaea L.

Türkçe:
Tavşan otu,
Mayasıl otu,
Kök boyası



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Agropyron cristatum (L.)
Gaertner

Türkçe:
Adi otlak ayrığı



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2500

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Aegilops cylindrica Host.

Türkçe:
Yuvarlak
buğday otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince): Poaceae	Familya (Türkçe): Buğdaygiller	Bitkinin Adı: Agrostis stolonifera L.	Türkçe: Sülüklü tavusotu
------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------



Ağrı Dağı: <input type="radio"/>	B10: <input type="radio"/>	Yaşı: Çok yıllık	Hayat Formu: Otsu	Yükseklik: 800-2000	Çiçekleme Ayları: ○○○○●○○○○○ 1 12	Fitocoğrafik Bölge: Avrupa- Sibirya	Endemizm: E
----------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---	--	----------------

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Avena sativa L.

Türkçe:
Yulaf



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Brachypodium pinnatum (L.)
P. Beauv

Türkçe:
Yalancı brom



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Bromus hordeaceus L.

Türkçe:
Arpamsı brom,



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran - Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Bromus japonicus Thunb.

Türkçe:
Japon bromu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1500

Çiçekleme Ayları:
○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Bothriochloa ischaemum (L.)
Keng

Türkçe:
Türkistan
sakal otu



Ağrı Dağı:
○

B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
600-800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Dactylis dlomerata L

Türkçe:
Domuz ayrığı



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2200

Çiçekleme Ayları:
○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Secale cereale L.

Türkçe:
Çavdar



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850--1600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

<i>Family (Latince):</i> <i>Poaceae</i>	<i>Familya (Türkçe):</i> <i>Buğdaygiller</i>	<i>Bitkinin Adı:</i> <i>Stipa pulcherrima k.Koch</i>	<i>Türkçe:</i> <i>İri sorguç otu</i>
			
<i>Ağrı Dağı:</i> ○	<i>B10:</i> ○	<i>Yaşı:</i> Çok yıllık	<i>Hayat Formu:</i> Otsu
<i>Yükseklik:</i> 1200-2400.	<i>Çiçekleme Ayları:</i> 		<i>Endemizm:</i> E
	1	12	<i>Fitocoğrafik Bölge:</i> İran - Turan

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Stipa lessingiana

Türkçe:
Sorguç otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Phleum alpinum

Türkçe:
Başlıklı fleum



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-3000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Poa bulbosa L.

Türkçe:
Yumrulu salkım
otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince): Poaceae	Familya (Türkçe): Buğdaygiller	Bitkinin Adı: Polypogon monspeliensis (L.) Desf.	Türkçe: Tavşanayağı				
							
Ağrı Dağı:	B10:	Yaşı:	Hayat Formu:	Yükseklik:	Çiçekleme Ayları:	Fitocoğrafik Bölge:	Endemizm:
○	○	Çok yıllık	Otsu	1000-1800	○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	-	E
					1	12	

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Hordeum murinum L. subsp
glaucum (Steudel) Tzvelev

Türkçe:
Pispişi arpası



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Poaceae

Familya (Türkçe):
Buğdaygiller

Bitkinin Adı:
Hordeum pusillum Nutt.

Türkçe:
Pispişe



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1800

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Polygonaceae

Familya (Türkçe):
Çobandeyneğigiller

Bitkinin Adı:
Rumex asetosa L. (Sorrel)

Türkçe:
İriyaprak
Kuzukulağı



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Polygonaceae

Familya (Türkçe):
Çobandeyneğigiller

Bitkinin Adı:
Rumex asetosella L.

Türkçe:
Kuşturşusu,
kırturşusu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-2100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Polygonaceae

Familiya (Türkçe):
Çobandeyneğigiller

Bitkinin Adı:
Rumex patientia L.

Türkçe:
At evelığı, Evelik



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1100-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Polygonaceae

Familya (Türkçe):
Çobandeyneğigiller

Bitkinin Adı:
Polygonum alpinum All.

Türkçe:
Dağ
çobandeyneği,
Söğüt otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500-2500

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Polygonaceae

Familiya (Türkçe):
Çobandeyneğigiller

Bitkinin Adı:
Polygonum aviculare R.

Türkçe:
Kuşekmeği,
kuşmadımağı



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Adonis aestivalis L.subsp.
aestivalis L.

Türkçe:
Keklikgözü
Kandamlası



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
950

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Adonis annua

Türkçe:
Şeytangözü



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçeğigiller

Bitkinin Adı:
Ranunculus cunealus Boiss.

Türkçe:
Körük otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Ranunculus kochii Lebed.

Türkçe:
Zehirli düğün
çiçeği



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1400-3000

Çiçekleme Ayları: ○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Ranunculus illyricus L

Türkçe:
Düğün çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Ranunculus unguis -cati Davis
subsp. *ağridağensis* Y.Z..

Türkçe:
Ağrı Dağı
kaymak çiçeği



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
✓

Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2300 m

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
Yeni

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçeğigiller

Bitkinin Adı:
Thalictrum minus L.

Türkçe:
Küçük
çayırsefedi



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Familya (Türkçe):
Düğünçiçeğigiller

Bitkinin Adı:
Thalictrum minus L. subsp
arenarium

Türkçe:
Küçük
çayırsedefi



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Ranunculaceae

Famİlya (Türkçe):
Düğünçeğİgİller

Bitkinin Adı:
Pulsatİlla vulgarİs L.

Türkçe:
Dağ İalesİ



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1700-3000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Resedaceae

Familya (Türkçe):
Kuzuotugiller

Bitkinin Adı:
Reseda lutea L.var. *lutea* L.

Türkçe:
Sarı muhammet
çiçeği



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rhamnaceae

Familya (Türkçe):
Cehrigiller

Bitkinin Adı:
Rhamnus pallasii Fisch. & Mey.

Türkçe:
Çehri



Ağrı Dağı: B10: ☒

Yaşı: ☒
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1100-1600

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familiya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Alchemilla caucasica Buser.

Türkçe:
Kafkas
aslanpençesi



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1800-2500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Alchemilla vulgaris L.

Türkçe:
Aslan pençesi,
Aslanayağı,
Şehduran



Ağrı Dağı:
○

B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Amygdalus communis L.

Türkçe:
Badem



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1000-1700

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Crataegus meyeri Poyark.

Türkçe:
Yemşen Hurmut



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1400-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Crataegus monogyna L.

Türkçe:
Yemşen, Garagile



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Ağaç

Yükseklik: 1100-1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Kafkasya

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Crataegus oxycantha L.

Türkçe:
Yemşen



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
900-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Cotoneaster integerrimus
Medik

Türkçe:
Tamkenarlı dağ
muşmulası



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Ç
Çok yıllık

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Cotoneaster nummularia
Fisch. & C.A.Mey.

Türkçe:
Dağ muşmulası



Ağrı Dağı: B10:
☑

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülğiller

Bitkinin Adı:
Filipendula vulgaris Moench.

Türkçe:
Kandil çiçeği



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1250-1750

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Sorbus aucuparia L. y.

Türkçe:
Üvez,
Guş armudu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Ağaç

Yükseklik: 2100

Çiçekleme Ayları: 1 12
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Sorbus persica Hedl

Türkçe:
İran üvezi



Ağrı Dağı: B10: ☒

Yaşı: ☒

Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1900

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Rubus idaeus L.var.
strigosus (michaux) maxim.

Türkçe:
Ahududu,
Morug



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○

Hayat Formu:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1900-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Rubus caesius L.

Türkçe:
Sürünüçü börtlen



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 1900-2200

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Rosa arvensis Huds.

Türkçe:
İri gül, Kuşburnu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1200-1500

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Rosa dumalis Bechst.

Türkçe:
Yabani gül,



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1200

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Rosa micrantha SM

Türkçe:
İt gülü, Kuşburnu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 1200-1600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Rosa pimpinellifolia L.

Türkçe:
Koyungözü



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
2100

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Famlyla (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Rosa pulverulenta Bieb.

Türkçe:
Şeytan Gülü,
Deli Gül



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
1500-1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa -
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Rosa hemisphaerica var.
rapinii rowley

Türkçe:
Sarı gül



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı: Çok yıllık
✓

Hayat Formu: Çalı

Yükseklik: 1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Pyrus salicifolia Pallas var.
serrulata Browicz

Türkçe:
Doğu armudu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1400-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Prunus iranica Kov.

Türkçe:
İran eriği, alça



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☒

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1100-1500

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Potentilla anatica Peşmen

Türkçe:
Alpin
beş parmak otu



Ağrı Dağı:
○

B10:
○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1900-3000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Doğu ve
G.Anadolu

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Famİlya (Türkçe):
Gülgİller

Bitkinin Adı:
Potentilla argentea L.

Türkçe:
Gümüşü beş
parmak otu,
çilek otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1400-2100

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rosaceae

Familya (Türkçe):
Gülgiller

Bitkinin Adı:
Potentilla humifusa Willd.

Türkçe:
Sürünücü
beşparmak otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600-2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rubiaceae

Familya (Türkçe):
Kökboyasigiller

Bitkinin Adı:
Asperula glomerata (Bieb.)
Griseb.subsp. *glomerata*
(Bieb.)Griseb.

Türkçe:
Yapışkan otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-2100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: E

Family (Latince):
Rubiaceae

Familya (Türkçe):
Kökboyasıgiller

Bitkinin Adı:
Asperula orientalis
Boiss. & Hohen

Türkçe:
Doğu
yapışkan otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2000,

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rubiaceae

Familya (Türkçe):
Kökboyasıgiller

Bitkinin Adı:
Galium spurium L.subsp
spurium L.

Türkçe:
Yalancı boya otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2300

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Rubiaceae

Familya (Türkçe):
Kökboyasıgiller

Bitkinin Adı:
Galium humifusum Bieb.

Türkçe:
Yatık gövedeli
yoğurt otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Rubiaceae

Familya (Türkçe):
Kökboyasıgiller

Bitkinin Adı:
Galium verum L.
subsp. verum

Türkçe:
Havotu, Sarı
çiçekli yoğurt otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Rubiaceae

Familiya (Türkçe):
Kökboyasigiller

Bitkinin Adı:
Rubia tinctorum L.

Türkçe:
Boyacı otu, Kök
boyası, kızılboya



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Salicaceae

Familya (Türkçe):
Söğütgiller

Bitkinin Adı:
Populus tremula L.

Türkçe:
Titrek kavak



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
1900-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Saxifragaceae

Familya (Türkçe):
Taşkıragiller

Bitkinin Adı:
Saxifraga granulata L.

Türkçe:
Taşkıran otu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2000-2600

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
. (Orobanchaceae) *Euphrasia*
officinalis subsp prostkoviana

Türkçe:
Göz otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-


Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Scrophularia auriculata var.
auriculata

Türkçe:
Köprük otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1800

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Linaria genistifolia L. Subsp.
ağırdağensis Y.Z.

Türkçe:
Ağrı dağı
katırtırnağımsı
nevruz otu



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
Yeni tür

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Linaria vulgaris Miller

Türkçe:
Doğu nevrüz otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1500

Çiçekleme Ayları: ○○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa
Sibirya

Endemizm: E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Melampyrum arvense L. var.
elatius Boiss.

Türkçe:
Artvin
melampirumu



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
850-2100

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●●●○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familiya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Pedicularis caucasica M. Bieb.

Türkçe:
Kafkas bit otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1400-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-
Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Pedicularis comosa L.

Türkçe:
Sarguclu bit otu



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı: Tek yıllık
✓

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1100-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Rhinanthus angustifolius C.C.

Türkçe:
Horoz otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1800

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Verbascum geminiflorum
Hochst.

Türkçe:
Çift çiçekli siğir
kuyruğu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1100

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Verbascum speciosum
Schrader

Türkçe:
Sığırkuyruğu



Ağrı Dağı: B10:
☒

Yaşı:
İki yıllık ☐

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1300-2100,

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Verbascum songaricum
Schrenk ex Fisch.et Mey.subsp.
subdecurrens Hub.Mor.

Türkçe:
Yarıkayıcı
Orta Asya
Sığır Kuyruğu



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Famila (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Verbascum
helianthemoides Hub.

Türkçe:
Mor
sığır kuyruğu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1800

Çiçekleme Ayları:



Fitocoğrafik
Bölge:

-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Verbascum oreophilum
C.Koch. var. *joannis* (Bordz.)
Hub.- Mor.

Türkçe:
Sığırkuyruğu



Ağrı Dağı: ☒

B10: ☐

Yaşı: İki yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-2200

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm: ☐

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familiya (Türkçe):
Sıracotuğiller

Bitkinin Adı:
Verbascum wiedemannianum
Fisch.et.Mey.

Türkçe:
Mavi çiçekli
sığırkuyruğu



Ağrı Dağı: B10:
☒

Yaşı:
İki yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1600

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Veronica persica

Türkçe:
Acem yavşanotu



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1300-2200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
VERONICA
gentianoides Vahl.

Türkçe:
Buzcul
yavşanotu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1200-1900

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Veronica multifida

Türkçe:
Bulağ otu



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1000-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Veronica anagallis-aquatica L.
subsp. *anagallis-aquatica* L.

Türkçe:
Yavşan otu



Ağrı Dağı: B10:
☒

Yaşı: Çok yıllık
☐

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 2350.

Çiçekleme Ayları:
☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Fitocoğrafik Bölge:
-

Endemizm: E

Family (Latince):
Scrophulariaceae

Familya (Türkçe):
Sıracotugiller

Bitkinin Adı:
Veronica orientalis Miller.
subsp. *orientalis*

Türkçe:
Gözmuncuğu
çiçeği, Benevşe



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı: Çok yıllık

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 1600-2000

Çiçekleme Ayları:
○○○○●●○○○○

Fitocoğrafik
Bölge: -

Endemizm: E

Family (Latince):
Solanaceae

Familya (Türkçe):
Patlıcangiller

Bitkinin Adı:
Hyoscyamus aureus L.

Türkçe:
Sarı ban otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1200

Çiçekleme Ayları:
○○○●●○○○○○

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Solanaceae

Familya (Türkçe):
Patlıcangiller

Bitkinin Adı:
Hyoscyamus niger L.

Türkçe:
Delibatbat



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-2300

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Tamaricaceae

Familya (Türkçe):
Ilgingiller

Bitkinin Adı:
Tamarix smyrnensis Bunge,

Türkçe:
Ilgın, Yılgın



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
900-1000

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Thymelaceae

Familiya (Türkçe):
Serçediligiller

Bitkinin Adı:
Daphne oleoides Schreber
Subsp. *kurdica* (Bornm.)

Türkçe:
Yabancı defne



Ağrı Dağı: B10:
○ ○

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Çalı

Yükseklik:
760-3000

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

Family (Latince):
Urticaceae

Familya (Türkçe):
Isırganotugiller

Bitkinin Adı:
Urtica dioica L.

Türkçe:
Isırgan otu,
Gıçitken



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı: Çok yıllık
○

Hayat Formu: Otsu

Yükseklik: 800-2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik Bölge:
Avrupa-Sibirya

Endemizm: E

A close-up photograph of a dense cluster of green, serrated leaves on thin, reddish-brown stems, likely a shrub or herb. The leaves are small, ovate, and have finely serrated margins. The stems are thin and woody, with some showing small, light-colored lenticels. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural, outdoor setting.

Family (Latince):
Ulmaceae

Familya (Türkçe):
Karaağaçgiller

Bitkinin Adı:
Celtis tournefortii Lam.
(sin. *C. orientalis* Miller)

Türkçe:
Turnefor
dağdağanı



Ağrı Dağı: B10:
✓

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Ağaç

Yükseklik:
300-1500

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Valerianaceae

Familya (Türkçe):
Kediotugiller

Bitkinin Adı:
Valeriana dioscorides SM

Türkçe:
Çoban zornası,
kedi otu



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1500-2000,

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●○○○○○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Valerianaceae

Familya (Türkçe):
Kediotugiller

Bitkinin Adı:
Valeriana officinalis L.

Türkçe:
Kedi otu



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1700

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
Avrupa-Sibya

Endemizm:
E

Family (Latince):
Violaceae

Familya (Türkçe):
Menekşegiller

Bitkinin Adı:
Viola canina

Türkçe:
Köpekmenekşesi



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
1000-1800

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Violaceae

Familya (Türkçe):
Menekşegiller

Bitkinin Adı:
Viola odorata L. T.Y.

Türkçe:
Kokulu menekşe,
Kır Menekşesi



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
2400

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Zygophyllaceae

Familya (Türkçe):
Üzerlikotugiller

Bitkinin Adı:
Tribulus terrestris L.

Türkçe:
Çoban çökerten



Ağrı Dağı: ○

B10: ○

Yaşı:
Tek yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1200

Çiçekleme Ayları:
○○○○○●●○○○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-

Endemizm:
E

Family (Latince):
Zygophyllaceae

Familya (Türkçe):
Üzerlikotugiller

Bitkinin Adı:
Peganum harmala L.

Türkçe:
Üzerlik



Ağrı Dağı: B10:
○

Yaşı:
○ Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
900-1200

Çiçekleme Ayları:
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 12

Fitocoğrafik
Bölge:
-


Endemizm:
E

Family (Latince):
Zygophyllaceae

Familya (Türkçe):
Üzerlikotugiller

Bitkinin Adı:
Zygophyllum fabago L.

Türkçe:
İt üzerliği



Ağrı Dağı: ☐

B10: ☐

Yaşı:
Çok yıllık

Hayat Formu:
Otsu

Yükseklik:
800-1000

Çiçekleme Ayları:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fitocoğrafik
Bölge:
İran-Turan

Endemizm:
E

LATİNCE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ

Sayfa

Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson	1
Amaranthus retroflexus L.	2
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	3
Anthriscus nemorosa (Bieb.) Spengel	4
Carum carviL.....	5
Conium maculatum L.	6
Eryngium billardieri Delar.	7
Heracleum sphandylum.....	8
Ferula communis L.	9
Ferula orientalis L. subsp. Orientalis	10
Malabaila secacul Banks & Sol.....	11
Torilis arvensis L.	12
Torilis leptophylla (L.) Reichb. Pitrak,	13
Tordylium hasslquistiae DC.	14
Zosima absinthifolia (Vent.) Link.....	15
Aster amellus L. subsp. ibericus (STEV.) Avestian	16
Anthemis cotula L.	17
Anthemis tinctoria L. var. tinctoria	18
Artemisia austriaca Jacq.	19
Achillea biebersteine Afan	20
Achillea millefolium L. subsp. millefolium L.....	21
Achillea tenuifolia Lam.	22
Achillea wilhelmsii C.Koch	23
Echinops pungens Trautv. var. pungens	24
Carduus collinus subsp. Cylindricus.....	25
Carduus pycnocephalus L. subsp. Albidus (Bieb.) Kazmi	26
Carduus nigrescens Vill.	27
Carduus nutans L. Subsp. Nutans	28
Centaurea cheiranthifolia Willd. var purpurascens (DC.) Waagenitz M.Bieb.	29
Centaurea cyanoides	30
Centaurea depressa Bieb.	31
Centaurea glastifolia	32
Centaurea pseudocabiosa Boiss. & Buche	33
Centaurea pichleri Boiss. subsp. pichleri Boiss.	34
Centaurea iberica Trev. ex Sprengel.....	35
Cichorium intybus L.,	36
Cirsium canum (L.) All	37
Cnicus benedictus L. var. benedictus L.	38
Crupin crupiastrum (Moris) Vis.	39
Chiliophyllum (Fisch & Meyer) (Schultz Bip var. Chiliopyllum	40
Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp. Rubicundum (C. Koch) Davis & Kupich	41
Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum	42
Inula oculus-christi L., 1200-1900 Avrupa- Sibirya	43
Jurinea moschus (Habl.) ssp pinnatisecta (Boiss.) Danina & Davis var. agridagensis Y.Z	44
Serratula serratuloides	45
Senecio vernalis Waldst. Et Kit.....	46
Scorzonera crocifolia	47
Scorzonera semicana DC. ,	48
Scorzonera hieraciifolia	49
Scorzonera rigida Aucher	50
Scorzonera mollis Bieb. subsp. mollis Bieb.	51
Lactuca serriola L.	52
Leontodon crispus Vill. (Syn. L. asperimus)	53
Leontodon hispidus L.	54
Pilosella echinoides (Lumn.) C.H. & F.W. Schultz.	55

LATİNCE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ**Sayfa**

Taraxacum officinale L.	56
Taraxacum fedtschenkoi Hand. -Mazz.	57
Taraxacum scaturiginosum G.Hadl.	58
Tanacetum abrotanifolium (L.)Druce	59
Tanacetum chiliophyllum (Ficsh.& Meyer) Schultz Bip.var. chiliophyllum	60
Tanacetum nitens(Boiss.& Noe) Grierson	61
Tanacetum parthenium(L.) Schultz Bipo.	62
tragopogon bubhthalmoides (DC.) Boiss. Var.latifolius	63
Tragopogon pterodes Panc.	64
Tussilago farfara L.	65
Xeranthemum annuum L.	66
Xeranthemum longipapposum FISCH. ET MEY.	67
Betula pendula Roth.	68
Berberis vulgaris L.	69
Alkana orientalis (L.) Boiss. Var.orientalis	70
Anchusa azurea Miller var.azurea Miller	71
Asperugo procumbens L.	72
Buglossoides arvensis (L.) Johnston	73
Cerinth minor L.	74
Cynoglossum montanum L.	75
Echium italicum L.	76
Echium russicum I. F. GMELIN	77
Heliotropium europaem L.	78
Lappula squarosa (Retz) Dumort	79
Myosotis olympica Boiss.	80
Myosotis lithospermifolia (Willd.) Homem	81
Nonea pulla L.(DC.)subsp.scabrisguamata A.Baytop	82
Onosma nigricaula H. Riedl	83
Onosma procerum Boiss.	84
Barbarea plantaginea DC. k	85
Alyssum montanum subsp. montanum	86
Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss.	87
Erysimum hamosum Blanche ex Posti.	88
Erysimum senoneri (Heldr. & Sart.) Wettst. Subsp. icaricum Snog.	89
Cardaria draba(L.)Desv.subsp. Draba(L.)Desv.	90
Cardamine lazica Boiss& Balansae	91
Crambe orientalis L.	92
Fibigia macrocarpa (Boiss.) Boiss.	93
Hesperis matronalis L.	94
Hirschfeldia incana	95
Isatis candolleana Boiss.	96
Lepidium vesicarium L.	97
Peltaria angustifolia DC.	98
Rapistrum rugosum (L.)All.	99
Rindera lanata var.lanata	100
Sinaps arvensis L.var.orientalis	101
Campanula glomerata L.subsp.hispida	102
Campanula stevenii M.Bieb	103
Campanula troegerae Damboldt	104
Lonicera caucasica Pallas subsp. orientalis (Lam.) Chamb.& Long	105
Lonicera xylosteum L.	106
Viburnum lantana L.	107
Arenaria leptoclados L.	108
Cerastium arvense L.	109
Cerastium berringianum	110

Cerastium tomentosum.....	111
Dianthus artwinensis	112
Dianthus spiculifolius.....	113
Dianthus zonatus var. Zonatus	114
Gypsophila cerastoides	115
Herniaria glabra L.....	116
Minuartia erythrocephala (Boiss.) Hard-Mazz. var. erythrosepala (Boiss.) Hand. -	117
Silene alba (MILLER) KRAUSE subsp. divaricata (REICHB.) WALTERS,	118
Silene arguta Fenzl.	119
Silene gallica L.	120
Silene conica L.	121
Silene inclinata Hub.-Mor.	122
Silene latifolia.....	123
Silene viscosa(L.)Pers	124
Silene vulgaris Moench) Gorcke var. Commutata(Guss.) Coode et Cullen	125
Silene vulgaris (Moench) Garcke	126
Stellaria media (L.) Vill. subsp.media	127
Chenopodium ficifolium SM.....	128
Chenopodium folisum (Moench) Aschers.	129
Kochia prostrata (L.) Schrad	130
Salsola dendroides Pall.	131
Convolvulus arvensis L.	132
.....	133
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba	134
Rosularia chrysantha (Boiss.) Tahkt.	135
Sedum lydium Boiss	136
sedum pilusum	137
Bryonia aspera Stev. ex Ledeb.(Syn. B.alba)	138
Bryonia dioica	139
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link.	140
Juniperus communis L.subsp. Communis L.....	141
Juniperus communis L. saxatilis Pall.	142
Juniperus excelsa Bieb.	143
Cuscuta planiflora Ten.....	144
Cuscuta babylonica Aucher ex Cholsy var. babylonica Aucher ex Cholsy	145
Scabiosa argentea L.	146
Scabiosa caucasica M.Bieb.(S.Alba).....	147
Cephalaria prosera Fisch.& Lall.	148
Euphorbia seguieriana Necker subsp. seguieriana	149
Euphorbia serrata var serrata	150
Euphorbia myrsintess L.	151
Euphorbia orientalis L.	152
Ephedra distachya	153
Ephedra major Host. T.y.	154
Astragalus aduncus Willd.....	155
Astragalus antalyensis	156
Astragalus alyssoides Lam.	157
Astragalus ajubensis Bunge	158
Astragalus davisii Chamb.et Matthews.	159
Astragalus bicolor Lam.	160
Astragalus declinatus Willd.	161
Astragalus eriocephalus Willd. subsp. eriocephalus Willd.	162
Astragalus cicer L.	163
Astragalus cedreticola A.Duran &Podlech	164
Astragalus chaldiranicus Kit Tan & Sorger	165

Astragalus psedoutriger Grossh.	166
Astragalus pinetorum Boiss.	167
Astragalus hirticalyx	168
Astragalus fumosus	169
Astragalus hyalolepis Bunge.	170
Astragalus odoratus Lam.,	171
Astragalus vesicaris L.subsp.ağrıdağensis Y.Z.	172
Coronilla minima L.subsp. Lotoides.....	173
Coronilla varia L.subsp. Varia L.....	174
Glycyrrhiza glabra L.	175
Medicago sativa L.	176
Melilotus officinalis(L.)Desr.	177
Sophora alopecuroides L. var.alopecuroides L.....	178
Trifolium arvense L.	179
Trifolium davissi Hossain	180
Trifolium campestre Schreb.	181
Trifolium montanum L. subsp. humboldtianum (A. BR.et Aschers.) Hossain	182
Trifolium pratense L.	183
Trifolium pratense L.var. pratense Boiss.& Bal.	184
Lathyrus cicera L.	185
Lathyrus karsianus PH.Davis.....	186
Lathyrus rotundifolius Wild.	187
Onobrychis araxina Schisch.	188
Onobrychis radiata(Desf.) Bieb.....	189
Onobrychis viciifolia Scop.	190
Vicia sativa L.subsp.satıva L.	191
Vicia villosa Roth.subsp.ericarpa(Hausskn.)PW.Ball.	192
Gentiana oliveri Griseb Afat	193
Erodium chrysanthum	194
Erodium cicutarium (L.) Hert. Subsp.cicutarium (L.) Hert.	195
Geranium asphodeloides Burm.Fil.,	196
Geranium tuberosum L.subsp. Tuberosum L.	197
Geranium macrostylum Boiss.....	198
Globularia trichosantha Fisch. & C.A.Mey.	199
Hypericum montbretii Spach.....	200
Hypericum perforatum L.	201
Gladiolus atrovioleaceus Boiss.,	202
Gladiolus kotschyanus Boiss	203
Iris caucasica Hoffm.subsp. caucasica ,	204
Iris spuria L.subsp.musulmanica (Fomin.) Takht.....	205
Iris iberica Hoffm.subsp. elegantissima (Sosn.)Takht. & Federov	206
Scleranthus annus L.....	207
Lamium album L.	208
Lamium maculatum L.var.villosifolium R.Mill.	209
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli var.Chia	210
Ajuga chamaepitys (L.) subsp.laevigata(Banks et Sol.)PH.Davis.....	211
Ajuga orientalis L.	212
Eremostachys laciniata (L.) Bunge.....	213
Phlomis tuberosa L.	214
Nepeta racemosa L.	215
Nepeta transcaucasica Grossh.....	216
Teucrium polium L.	217
Thymus praecox Opiz. subsp. caucasicus (Ronniger) J alas. var. grossheimii (Ronniger) J alas	218
Thymus transcaucasicus Ronniger	219
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.subsp.glabrescens Boiss.....	220

Thymus fallax Fisch. & Mey.	221
Acinos alpinus subsp. alpinus	222
Salvia cassia Samuelss ex Rech.Fil.	223
Salvia hydrangea	224
Salvia nemrosa L.	225
Salvia huberi Helge	226
Salvia limbata C.M.Meyer	227
Salvia verbenaca L.	228
Scutellaria orientalis subsp. santolinoides (Hauskn.ex Bornm.) Edmondson	229
Stachys annua (L.) L.subsp.annua var lycanica Bhattacharjee	230
Stachys iberica Bieb.subsp.iberica var.densipilosa Bhattacharjee	231
Stachys lavandulifolia Vahl var.lavandulifolia	232
Ziziphora clinopodioides Lam.	233
Allium akaka S.G.Gmelin	234
Allium agridagensis(armenum) Boiss. & Kotschy. Et Y.Z	235
Allium balansae	236
Allium cardiostemon Fisch. & Mey.	237
Allium hirtifolium Boiss.var.hirtulum Regel	238
Allium incisum Fomin	239
Asparagus persicus Baker	240
Bellevalia gracilis Feinbrun	241
Bellevalia pyncnantha(C.Koch.) A.Los.-Los.	242
Bellevalia fominii Woronov	243
Colchicum szovitsii Fisch. & Mey.subsp. szovitsii	244
Fritillaria caucasica J.F.Adam, ,	245
Gagea luteoides Stapf	246
Gagea peduncularis	247
Scilla sibirica Haw.	248
Linum tenuifolium	249
Muscari comosum (L.) Miller	250
Muscari neglectum Guss.	251
Puschkinia ssilloides Adams	252
Ornithogalum narbonense	253
Ornithogalum nutans L.	254
Ornithogalum oligophyllum E.D.Clark	255
Ornithogalum pereniaceum L.	256
Abutilon theophrasti Medic.	257
Althaea officinalis L.	258
Alsea calverti Boiss.	259
Malva neglecta Waqllr	260
Malva nicaeensis All.	261
Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.),y,	262
Orchis coriophora (syn.Anacamptis coriophora)	263
Orchis mascula (L.) L. subsp. longicalcarata	264
Orobanchae aegyptica Pers.	265
Orobanchae anatolica	266
Orobanchae cernua f.typica Boiss.	267
Orobanchae elatior Sutton	268
Phelypaea coccinea (Bieb.) Poir.	269
Glaucium corniculatum(L.) Rud.	270
Glaucium leiocarpum Boiss.	271
Papaver pinnatifidum Moris.	272
Papaver apokrinomenon Fedde	273
Papaver dubium L.	274
Papaver rhoeas L.	275

Papaver fugax Poidet var. platydicus Cullen	276
Papaver pseudo-orientale	277
Papaver orientale L.	278
Anagallis arvensis L. var.caerulea	279
Primula auriculata Lam.	280
Primula veris ssp.macrocalyx	281
Primula elator (L.) Hill.subsp. Meyeri	282
Plantago lanceolata L.	283
Plantago major L.	284
Plantago media L.	285
Acantholimon calvertii.	286
Plumbago europaea L. , ,	287
Agropyron cristatum (L.) Gaertner	288
Aegilops cylindrica Host.	289
Agrostis stolonifera L.	290
Avena sativa L.	291
Brachypodium pinnatum (L.) PBeauv	292
Bromus hordeaceus L.	293
Bromus japonicus Thunb.	294
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	295
Dactylis diomerata L.	296
Secale cereale L.	297
Stipa pulcherrima k.Koch	298
Stipa lessingiana	299
Phleum alpinum	300
Poa bulbosa L.	301
Polypogon monspeliensis (L.)Desf.	302
Hordeum murinum L. subsp glaucum (Steudel) Tzvelev	303
Hordeum pusillum Nutt.	304
Rumex asetosa L.(Sorrel)	305
Rumex asetosella L.	306
Rumex patientia L.	307
Polygonum alpinum All.	308
Polygonum aviculare R.	309
Adonis aestivalis L.subsp. aestivalis L.	310
Adonis annua	311
Adonis volgensis Steven ex DC.	312
Ranunculus cunealus Boiss.	313
Ranunculus kochii Lebed.	314
Ranunculus illyricus L.	315
Ranunculus unguis -cati Davis subsp. agridağensis Y.Z.	316
Thalictrum minus L.	317
Thalictrum minus L.subsp arenarium.....	318
Pulsatilla vulgaris L.	319
Reseda lutea L.var. lutea L.	320
Rhamnus pallasii Fisch. & Mey.	321
Alchemilla caucasica Buser.	322
Alchemilla vulgaris L.	323
Amygdalus communis L.	324
Crataegus meyeri Poyark.	325
Crataegus monogyna L.	326
Crataegus oxycantha L.	327
Cotoneaster integerrimus Medik ,	328
Cotoneaster nummularia Fisch. & C.A.Mey.	329
Filipendula vulgaris Moench.	330

Sorbus aucuparia L. y.....	331
Sorbus persica Hedl.....	332
Rubus idaeus L.var. Strigosus(Michaux) Maxim.....	333
Rubus caesius L.	334
Rosa arvensis Huds.	335
Rosa dumalis Bechst.	336
Rosa micrantha SM.....	337
Rosa pimpinellifolia L.....	338
Rosa pulverulenta Bieb.....	339
Rosa hemisphaerica var.rapinii Rowley.....	340
Pyrus salicifolia Pallas var. serrulata Browicz	341
Prunus iranica Kov.....	342
Potentilla anatolica Peşmen	343
Potentilla argentea L.	344
Potentilla humifusa Willd.	345
Asperula glomerata (Bieb.)Griseb.subsp. glomerata (Bieb.)Griseb.	346
Asperula orientalis Boiss.& Hohen	347
Galium spurium L.subsp spurium L.....	348
Galium humifusum Bieb.....	349
Galium verum L.subsp.verum	350
Rubia tinctorum L.	351
Populus tremula L.....	352
Saxifraga granulata L.....	353
(Orobanchaceae) Euphrasia officinalis subsp prostkoviana	354
Scrophularia auriculata var.auriculata	355
Linaria genistifolia L.Subsp. ağrıdağensis Y.Z	356
Linaria vulgaris Miller	357
Melampyrum arvense L. var. elatius Boiss.	358
Pedicularis caucasica M.Bieb	359
Pedicularis comosa L.	360
Rhinanthus angustifolius C.C.	361
Verbascum geminiflorum Hochst.....	362
Verbascum speciosum Schrader	363
Verbascum songaricum Schrenk ex Fisch.et Mey.subsp. subdecurrens Hub.Mor.	364
Verbascum helianthemoides Hub.....	365
Verbascum oreophilum C.Koch. var.joannis (Bordz.) Hub.-Mor.	366
Verbascum Wiedemannianum Fisch.et.Mey.	367
Veronica persica	368
VERONICA gentianoides Vahl.	369
Veronica multifida	370
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica L.	371
Veronica orientalis Miller.subsp. orientalis	372
Hyoscyamus aureus L.....	373
Hyoscyamus niger L.....	374
Tamarix smyrnensis Bunge	375
Daphne oleoides Schreber Subsp.kurdica(Bornm.).....	376
Urtica dioica L.....	377
Ulmus minor Miller subsp. Minor.....	378
Celtis tournefortii Lam.(sin.C.orientalis Miller)	379
Valeriana dioscorides SM	380
Valeriana officinalis L.....	381
Viola canina	382
Viola odorata L. T.Y.....	383
Tribulus terrestris L.	384
Peganum harmala L.	385
Zygophyllum fabago L.....	386

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

Karayosunu	1
Kırmızı köklü horoz ibiği	2
Gımgımı, gımı	3
Gımgımı, Gımı	4
Kır kimyonu, Tarak otu	5
Baldıran	6
Boğa diken, Çakır diken	7
Tavşancıl otu, Baldırgan	8
Deli çadır çok yıllık	9
Eşek çarısı	10
Kelemkeşir, manda	11
Pıtrak	12
Pıtrak, çocukboğan	13
Geyik otu	14
Peynir otu, Ayıeli	15
Kafkas yıldızı	16
Köpek papatyası, Papatya, Hozan çiçeği	17
Sarı papatya	18
Kokulu yavşan	19
Kılıç otu, Anadolu teleme otu, sarı çiçek	20
Civanperçemi, Sancı otu	21
Çobankirpiği, Kirpit	22
Çeren, servi otu	23
Topuz	24
Devediken	25
Eşek diken, Sık başlı kangal	26
Deve diken	27
Deve diken Eşek diken	28
Acımık Morumsu peygamber çiçeği	29
Peygamber çiçeği,	30
Göybaş, Peygamber çiçeği, açımık	31
sarı peygamber çiçeği	32
Tüylü peygamber çiçeği	33
Peygamber çiçeği	34
Yaban diken, Çakırdiken, Çayır diken	35
Yabani hindiba, Çıtlık	36
Gangal	37
Şevketi bostan, Bostanotu, Mübarekdiken	38
Adi Gelindöndüren	39
Çeren, ormandere, yavşan	40
Pembemsi ölmez çiçek Yayla çiçeği	41
Ölmezçiçek, Yayla çiçeği	42
Yünlü pirekiran	43
Ağrı dağı gazan kulpu	44
Gerçek topbaş	45
Ekin otu, Pisik otu	46
Burçalak, Yemlik	47
Yemlik, gilekoçuk, gizer	48
Dedesakalı	49
Havuç	50
Burçak, Katırtırnağı	51
Acımarul, Yabani marul	52
Aslandışı	53
Aslandışı	54
Sarı atmaca otu	55

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

Karahindiba, adi aslandişi	56
Hapşuruk otu, Zincir otu	57
Boylu karahindiba	58
Ala renkli solucan otu	59
Çeren, ormadere, yavşan	60
Pire otu, Solucan otu	61
Gümüşdügme	62
Yemlik	63
Teke sakalı	64
Devetabanı, Kabalak	65
Süpürge otu, Dağ karanfili	66
Süpürge otu	67
Adi Huş	68
Kadın tuzluğu	69
Sarı havacıva otu	70
Gök mavisi sığirdili, güriz	71
Boya kökü	72
Taşkesen otu	73
Küçük mum çiçeği,	74
Dağ köpekdişi	75
Bal çiçeği, Engerek otu	76
Engerek otu	77
Bozot	78
Lappula	79
Uludağ sevdacı çiçeği, Uludağ Unutmabenisi	80
Sedef otu yapraklı unutmabenisi	81
Sormuk	82
Sormuk	83
Emzik otu	84
Sinir otuna benzer Nicer otu	85
Kuduz otu	86
Kaplan pençesi	87
Çengelli Kaplan Pençes	88
İkar yunan otu	89
Çok yıllık kır teresi Deniz lahanası	90
Tüylü su teresi	91
Deniz lahanası, Gelinteli	92
Çüneş otu	93
Gece gündüz çiçeği	94
Deli turp Melez hardal	95
Boya otu	96
Aş pençeri, Tere otu	97
Kalkan çiçek	98
Türpenk	99
Yunlu gelin	100
Yaban hardalı y.	101
Topbaş çan çiçeği	102
Çan çiçeği	103
Artvin çan çiçeği	104
Kafkas hanımeli	105
Hanımeli	106
Germeşo	107
Kum otu	108
Boynuz otu	109
Alpin yapışkan boynuz otu	110

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

Boynuz otu, Farekulağı	111
Artvin karanfili	112
Beyaz karanfil	113
Halkalı Karanfil	114
Çöven	115
Kaşık otu, çıplak kınılma otu	116
Kırmızı sepalı koru otu	117
Garagile, yapışkan otu	118
Gicime, Yapışkan otu	119
Güzel yapışkan otu	120
Konik yapışkan otu	121
Eğik yapışkan otu	122
Yapışkan otu	123
Tüylü çiçek yapışkanotu	124
Gıvışkan otu	125
Gıvışkan, Gelinparmağı	126
Yıldız otu, Çinçilim	127
Kazayağı, sirken	128
İt üzümü	129
Adi bozkırotu	130
Deve kıran	131
Sarmaşık, Dolaşkan	132
BozTarla sarmaşığı	133
Camişgulağı	134
Parmak otu	135
Kaya kuruğu, Damkuruğu	136
Kaya kuruğu, Damkuruğu	137
Çitkabağı	138
Çitkökü, Çit kabağı, itkabağı	139
Çayır yassı sazi	140
Apin adi ardıcı	141
Adi ardıc	142
Ekselsa ardıcı	143
Küsküt otu	144
Küsküt otu	145
Gıcık otu Uyuz otu	146
Kavkas Uyuz otu	147
Gevrek, Yüksek pelemir	148
Sütleyen	149
Serrat yapraklı sütlegen	150
Yatik sütlegen	151
Sütlegen	152
Ebu Cehil	153
Deniz üzümü	154
Kançalı geven	155
Antalya geveni	156
Korungaya benzer geven	157
korungaya benzer geven	158
Davisii geveni	159
Geven	160
Geven, yonca	161
Çok başlı geven	162
Nohut yaprak geven	163
kırmızı çiçekli geven	164
Çaldıran geveni	165

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

Geven.....	166
Orman geveni.....	167
Geven.....	168
Geven.....	169
Şeffaf pullu geven, yonca.....	170
Sarı geven.....	171
Ağrı Dağı Geveni.....	172
korunga.....	173
Renkli burçak.....	174
Meyan.....	175
Yonca.....	176
Eşek yonçası,Kokulu sarı yonca.....	177
Acı meyan,Sofora.....	178
Tarla üçgülü.....	179
Davis üçgülü.....	180
Altuni üçgül,üzüm.....	181
Dağ üçgülü.....	182
Çayır üçgülü.....	183
Eşek yoncası, Üçkulak otu.....	184
Kırmızı mürdümük.....	185
Kars Mürdümüğü.....	186
Kırmızı mürdümük.....	187
Aras korungası.....	188
Aleme çiçeği.....	189
Korunga, gorulgan.....	190
Adi fiğ.....	191
Bakla,Tüylü üçgül.....	192
Centyana.....	193
Çoban döndüren, Krizantem.....	194
Leylek gagası,iğneçik,Dönbaba.....	195
Turnagagası.....	196
Tavşantopu, Yumrulu tavşantotu.....	197
Turnagagası.....	198
Doğu demir omcası.....	199
Çay otu.....	200
Kantaron çiçeği, Ülser otu,Çayotu.....	201
Glavor.....	202
Glavor,Papak otu.....	203
Sarı süsen, Kızmemesi.....	204
Müslüman süseni.....	205
Kurtkulağı.....	206
Yıllık yumak otu.....	207
Beyaz çiçekli ballibaba.....	208
Tüylü ballibaba.....	209
Mayasılıyu, Acıgıc.....	210
Mayasilotu,Tüysüz yerçami.....	211
Mayasıl otu,.....	212
Yırtmaç yapraklı tekbaşak.....	213
Pamuk dağı yel otu.....	214
Kedi nanesi.....	215
Kafkasya kedinanesi.....	216
Taşkekiği, Bodur otu, kısamahmut.....	217
Keklik otu,Kekotu, kekik.....	218
Kekik,Kekotu,Keklik otu.....	219
Kekik,kekotu,keklik otu.....	220

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

Kekik,Keklik otu.....	221
Alpin acınotu	222
Yayladağı adaçayı.....	223
Ağrı adaçayı	224
Çöl çayı Adaçayı	225
Ada çayı	226
Maldili	227
Demirotumsu adaçayı	228
Doğu adaçayı	229
Dağ çayı	230
Dağ çayı	231
Dağ çayı	232
Merze,Reyhan	233
Yabani sarımsak	234
Ağrıdağ sarımsağı.....	235
Balansae soğanı	236
Silim soğanı	237
Tüylü yapraklı soğan	238
Kaya soganı.....	239
Ağrıdağı kuşkonmazı, Meleşöyüt	240
Dağ sümbülü	241
Aşpenceri	242
Dağ sümbülü.....	243
Karçiceği, Danagıran	244
Kafkas Terslalesi.....	245
Sarı yıldız,Altın yıldızı.....	246
Altın yıldız	247
Sibirya dağ soğanı	248
Zarif Yapraklı Keten,Zeyzek	249
Arap sümbülü, Arap taşıağı.....	250
Gavur nergisi, Arapotu	251
Kardelen.....	252
Akyıldız,Tükrükotu.....	253
Akyıldız,Tükrük otu.....	254
Kurtsoğanı.....	255
Akyıldız, pirene Tükrük otu.....	256
İmam kavuğu	257
Gülhatmi	258
Hatmi çiçeği	259
Ebegümeci	260
Ebegümeci	261
Salep	262
Doğu salebi	263
Sümbül, Çam Erkil Salebi	264
Mısır Canavar otu.....	265
Anadolu çanavar otu	266
Mavimsi canavar otu	267
Boylu Canavar otu	268
Kardeşkanı	269
Kırmızı boynuzlu gelinçik.....	270
Boynuzlu gelincik	271
Beşparmak gelinçik	272
Çütlale,Kel lale	273
Meşkük haşhaşı	274
Gelincik	275

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

Kıllı gelinçik	276
Ala haşhaş Yabani haşhaş	277
Doğu haşhaşı Yabani haşhaş	278
Farekulağ	279
Mustafa çiçeği, Ayıkulağı	280
İri çuhaçiçeği, Ayrancıçiçeği	281
çuha çiçeği	282
Lanset şekilli sinir otu, Gılıçotu	283
Sinir otu, Bağa yaprağı	284
Kılıçotu, Tıbbi sinirotu,	285
At geveni, Ağrı dağı Çoban yastığı	286
Tavşan otu, Mayasıl otu, Kök böyası	287
Adi otlak ayrığı	288
Yuvarlak buğday otu	289
Sülüklü tavusotu	290
Yulaf	291
Yalancı brom	292
Arpamsı brom,	293
Japon bromu	294
Türkistan sakal otu	295
Domuz ayrığı	296
çavdar	297
İri sorguç otu, çok yıllık,	298
Sorguç otu	299
Başlıklı fleum	300
Yumrulu salkım otu	301
Tavşanayağı	302
Pispişi arpası	303
Pişpişe	304
İriyaprak Kuzukulağı	305
Kuşturşusu, kırturşusu	306
At eveligi, Evelik	307
Dağ çoban değneği, Söğüt otu	308
Kuşekmeği, kuşmadımağı	309
Keklikgözü Kandamlası	310
Şeytangözü	311
Sarı çiçekli Adonis	312
Körük otu	313
Zehirli düğün çiçeği	314
Düğün çiçeği	315
Ağrı Dağı kaymak çiçeği	316
Küçük çayırsedefi	317
Küçük çayırsedefi	318
Dağ lalesi	319
Sarı muhammet çiçeği	320
Çehri	321
Kafkas aslanpençesi	322
Aslan pençesi, Aslanayağı, Şehduran	323
Badem	324
Yemşen Hurmut	325
Yemşen, garagile	326
Yemşen	327
Tamkenarlı dağ muşmulası	328
Dağ muşmulası	329
Kandil çiçeği	330
Üvez	331

TÜRKÇE BİTKİ İSİMLERİ İNDEKSİ Sayfa

İran üvezi	332
Ahududu	333
Sürünücü börtlen	334
İri gül, Kuşburnu	335
Yabani gül,	336
İt gülü, Kuşburnu	337
Koyungözü	338
Şeytan Gülü, Deli Gül	339
Sarı gül	340
Doğu armudu	341
İran eriği, alça	342
Alpin beş parmak otu	343
Gümüşü beş parmak otu, çilek otu	344
Sürünücü beşparmak otu	345
Yapışkan otu	346
Doğu yapışkan otu y.	347
Yalancı boya otu	348
Yatık gövedeli yoğurt otu	349
Havotu Sarı çiçekli yoğurt otu	350
Boyacı otu Kök boyası, kızılboya	351
Titrek kavak	352
Taşkıran otu	353
Göz otu	354
Köprük otu	355
Ağrı dağı katırtırnağımsı nevrüz otu	356
Doğu nevrüz otu	357
Artvin melampirumu	358
Kafkas bit otu	359
Sarguçlu bit otu	360
Horoz otu	361
Çift çiçekli siğir kuyruğu	362
Siğirkuyruğu	363
Yukarı kayıcı, Orta asya siğir kuyruğu	364
Mor siğir kuyruğu	365
Siğirkuyruğu	366
Mavi çiçekli siğirkuyruğu	367
Acem yavşanotu	368
Buzcul yavşanotu	369
Bulağ otu	370
Yavşan otu	371
Gözmuncuğu çiçeği, Benevşe	372
Sarı ban otu	373
Delibatbat	374
İlgın, Yılgın	375
Yabani defne	376
Isırgan otu, çiçikten	377
Karaağaç	378
Turnefor dağdağanı	379
çoban zurnası, kedi otu	380
Kedi otu	381
Köpekmenekşesi	382
Kokulu menekşe, Kır Menekşesi	383
Çobançökerten	384
Üzerlik	385
İt üzerliği	386

KAYNAKLAR

- Akan, H., Eker, İ. ve Balos, M. M. (2005) Şanlıurfa'nın Nadide Çiçekleri (Geofitler), Şanlıurfa Belediyesi Kültür Yayınları, Şanlıurfa
- Altınayar, G. (1987) Bitki Bilimi Terimleri Sözlüğü. DSI Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara.
- Baytop, T. (1997). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kur. Yay: 578, Ankara.
- Baytop, A. (1998) Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 4058, İstanbul.
- Davis, P. H. (1965-1982). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. 1-11 Edinburgh Univ. Pres. Edinburgh .
- Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Ankara.
- Gökçek, Ö. Zeynalov, Y., Farzaliyev, V. (2009) Giberellik asit,aşındırma ve katlama uygulamalarının bazı Pistacia türlerinde tohum çimlenmesi ve çöğür gelişimi üzerine etkisi. Azerbaycan milli
- Günel, N. (1997). Türkiye'de Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışları, Ekolojik ve Floristik Özellikleri, Çantay Kitapevi, İstanbul.
- İskender, E., Zeynalov, Y., Özaslan, M., İncik, F.N., Yayla, F. 2006 Türkiye florasında bulunan bazı nadir ve nesli tükenmekte olan odunsu bitkilerin biyoeekolojik özelliklerinin incelenmesi XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, s: 123-124, 26-30 Haziran Kuşadası-Aydın
- Meikle, R.D. (1985). Flora of Cyprus, Vol. 2, R.B.G., Kew, Edinburgh.
- Post G.E. (1932) Flora of Syria, Palestine and Sinai (2nd. ed. revised by J. E. Dinsmore). American Press, Beirut.
- Seçmen Ö., Leblebici E. (1997) Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir
- Tekin E. (2005) Türkiye'nin En Güzel Yaban Çiçekleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
- Türkoğlu M. ve Duran S. 2006. İçdir İl Çevre Durum Raporu. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
- İTİM, 2002. İçdir İl Tarım Master Planı. İçdir Tarım İl Müdürlüğü.
- Türkoğlu, M., İlikler A., Pamukoğlu, N. (2010) Türkiye'deki Myocastor Cypus (Molina 1782)'un Bazı Biyolojik Ve Ekolojik Özellikleri Tabiat ve İnsan Dergisi Yıl:42-2008 Sayı:2 sayfa 17-21
- TAGEM, (2012) Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (106G017)
internet: <http://www.ulusalmera-tagem.gov.tr/default.asp>
- TUBIVES, 2012. Türkiye Bitkileri Veri Sistemi.
Internet: <http://turkherb.ibu.edu.tr> (12 Nisan 2012de alındı).
- Zeynalov, Y., Yelken, H., Yayla, F., Uma, M.M. (2007) Gaziantep İlinde Tespit Edilen Orchidaceae Familyasına Ait Bitkiler Ve Korunma Durumları, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10-13 Eylül, Revize Proram ve Ek Özetler, s:41; pstr-193, Malatya
- Zeynalov, Y., Yelken, H., Yayla, F., Uma, M.M. (2008) Eşsiz Bir Çiçek Kitabelia balansae, Ayıntap Kültür-sanat-edebiyat dergisi, mayıs-Ağustos, no:11, s:29-30
- Zeynalov Y. Yayla F Uma M. M., Küçük V. Farzaliyev V. (2008) Gaziantep üniversitesi Botanik Bahçesi Liliaceae Koleksiyonu, AMEA'nın botanika Enstitüsünün Elmi Eserleri, XXVII, s: 84-87
- Zeynalov Y., İskender E., Özaslan M., Yayla F ve İncik F. N., (2006) Denroflora Of Gaziantep University Botanic Garden (Turkey) *Ancient Parks and Botanical Gardens – scientific center Biodiversity Conservation and Protection of Historical and Cultural Heritage, 22-25 September 2006 Umman, Ukraine.s:199*
- Zeynalov Y., Pehlivan M, Farzaliyev, V. (2006) C6 karesi (Gaziantep) İçin yeni kayıtlar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü İlmi Eserleri, Cilt XXVII, s: 284-289, Bakü Azerbayca
- Zeynalov Y., Yelken H., Yayla F, Uma M.-M (2008) Gaziantep çiçekleri 1. cilt 644 s. Ajans-Türk yayın ve basım evi,Ankara

- Zeynalov Y. (2008) İlaç Bitkiler –tarihi gelişimi ve kullanımları. Aden yayın evi. 238 s. İstanbul,
- Zeynalov Y., Yayla F., Uma M. M. (2008) Huzurlu Yaylası (Gaziantep) florası, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2327 Haziran, Trabzon
- Zeynalov Y., Yayla F., Uma M. M., Yalken H. (2008) Gaziantep ili Endemik ve Nadir Bitkileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2327 Haziran, Trabzon.
- Zeynalov, Y. (2009) *Kitabelia balansea* ve *k. Vilosa* ve *k. Vilosa* növelerinin çoğaldılması ve qaziantep büyük şehir nebatat bağına introduksiyası. Azərbaycan Milli Botanik bəhçesinin Kitabı s.63-66 Bakü
- Zeynalov Y.Hüseynli N. (2009) Apşeron yarımadasınınLandşaftları ve ekolojik problemleri ,Kafkas Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsünün dergisi Cilt 2 Sayı 1, s.41-45 Kars
- Zeynalov, Y. (2011) Gaziantep Florasında Yetişen Orchidaceae L. (Sahlepgiller) Familyasına ait tespiti yapılan bitkiler. 11 Uluslar arası konferansı,25-27 kısım s.42-46 Gence /Azerbaycan
- Zeynalov, Y., Özkan, A. (2010)Enginar (*Cynara scolymus*) bitkisinin bioekolojik özellikleri ve Gaziantep Botanik bahçesine introduksiyonu.Uluslar arası tıbbi bitkiler sempozyumu,3-4 ekim 2010,Umman ,İngilışçe/.
- Zeynalov, Y., Gökçek, B. (2010) Gaziantep florasında yetişen süsen (*Iris L.*) türlerinin Gaziantep Büyükşehir Botanik Bahçesine introduksiyonu. XX Ulusal Biyoloji kongresi Denizli Üniversitesi 21-25 haziran 2010, s.440 Denizli/ Türkiye.
- Zeynalov, Y. Yayla, F (2010) Gaziantep süsenleri (*Iridaceae L.*). XX Ulusal Biyoloji kongresi Denizli Üniversitesi 21-25 haziran 2010,s.485, Denizli /Türkiye
- Zeynalov, Y., Yayla, F (2010) Gaziantepin parazit bitkileri.). XX Ulusal Biyoloji kongresi Denizli Üniversitesi 21-25 haziran 2010,s.486, Denizli /Türkiye
- Zeynalov, Y., Yayla, F., (2011) Gaziantep İli'nin Ada Çayları, 10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi s.298- 4-8 Ekim 2011, Çanakkale.
- Zeynalov, Y., Yayla F (2011) Gaziantep çiçekleri 2.cilt 542 s. Ajans-Türk yayın ve basım evi,Ankara
- Zeynalov Y., Budak F (2012) Ağrı Dağı Florasında tespit olunan *Astragalus Türleri I* X1X Ulusa Çevre kongresi s. 367 Kilis
- Zeynalov, Y., Kumlay, A.M., Koç, A., Yayla, F (2012) Gaziantep ili ve çevresinde tespit edilen ters lale (*Fritillaria*) türleri .AMEA Merkezi nebatat bağının elmi eserleri X cilt,s.59-65 Bakü (Türkçe)
- Zeynalov, Y., Kumlay, A.M., Koç, A., Gökçek, B. (2012) Ters lale (*Fritillaria*) türlerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesinde introduksiyonu. AMEA Merkezi nebatat bağının elmi eserleri X cilt,s.86-95, Bakü.
- Zeynalov, Y., 2012. Nuhun Çiçekleri. Aralık Kaymakamlığı Yayını.
- Zeynalov, Y., Kumlay, A.M., Zengin, H. (2014) Ağrı Dağı ve çevresinde Belirlenen Tıbbi ve aromatik açıdan önemli *Thymus* türleri. 11Tıbbi ve Aromatik bitkiler sempozyumu 23-25 eylül 2014,s.32, Yalova
- Zeynalov, Y. (2013) Determination of plant species belonging to Asteraceae L. family on Aghri mountain ,Turkey International Conference environmental changes conservation of plant diversity conference program and abstract book 21-23 April 2013 Bakü
- Zeynalov, Y. (2013) Endemic and rare plants of Huzurlu plateau (Gaziantep,Türkey) Canadian Journal of Applied Sciences 2(4): 440-458 2013,Canada
- Zeynalov, Y. Yılmaz, İ.H., Akdeniz, H. (2014) Ağrı DağınFlorasında tespiti yapılan Rosaceae Familyasına ait olan bitki türlerinin inçelenmesi Uluslar Arası Flora İnçelemeleri ve Ekoloji kongresi s.45-51, Bakü
- Zeynalov, Y., Kumlay, A.M., Zengin, H. (2014) Ağrı dağı ve çevresinde belirlenen tıbbi ve aromatik açıdan önemli *Thymus* türleri. 11Tıbbi ve Aromatik bitkiler sempozyumu 23-25 eylül 2014 YALOVA s.32
- Zeynalov, Y. Akdeniz, H. Yılmaz, İ.H. (2014)Study on Plant Species Belonging to Fabaceae L. Family in Flora of Ağrı Mountain Journal of Environmental Science and Engineering A 3 (2014) 204-210

Fotoğraf: Zeynep ÇOBAN
Ağrı Dağı



